

# Espaces vectoriels

## Résultats et preuves à connaître

**Proposition 1** Formule de Stirling & série harmonique Sans démonstration

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

et

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n) + \gamma + o(1)$$

**Définition 1** Espace vectoriel - Application linéaire - Sous-espace affine - Sommes directes

Donner les définitions de :

- $(E, +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace-vectoriel Et en donner 4 exemples différents
- $\mathcal{F}$  est un sous-espace affine de  $E$
- $(F_1, \dots, F_p)$  sont en somme directe.

**Proposition 2** Espace engendré par une famille de vecteurs

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev et  $X = (x_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ , alors le sous-espace vectoriel de  $E$  engendré par  $X$  est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de  $X$ , c'est-à-dire

$$\text{vect}(X) = \text{vect}(x_i)_{i \in J} = \left\{ \sum_{i \in J} \lambda_i \cdot x_i \mid (\lambda_i)_{i \in J} \text{ famille finie de scalaires} \right\}$$

**Proposition 3** Propriétés

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev,  $X$  et  $Y$  des parties de  $E$ .

• **Inclusion** :  $X \subset Y \implies \text{vect}(X) \subset \text{vect}(Y)$

• **Enlever un vecteur** :

Si  $x \in X$  est combinaison linéaire des vecteurs de  $X \setminus \{x\}$  alors  $\text{vect}(X) = \text{vect}(X \setminus \{x\})$

**Proposition 4**

Soit  $I$  un ensemble non vide.

Si  $(E_i)_{i \in I}$  une famille de sous- $\mathbb{K}$ -espace vectoriels de  $E$  alors  $\bigcap_{i \in I} E_i$  est un sous- $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de  $E$ .

**Proposition 5** Union de deux sev

Soient  $F$  et  $G$  deux sous- $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de  $E$ .

$F \cup G$  est un sous- $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de  $E$  si et seulement si  $F \subset G$  ou  $G \subset F$

**Proposition 6** Union et somme

Si  $F$  et  $G$  sont deux sous-espace vectoriel de  $E$  alors  $F + G = \text{vect}(F \cup G)$

**Proposition 7** Caractérisation de la somme directeF et G sont en somme directe ssi  $F \cap G = \{0_E\}$ **Proposition 8** CaractérisationSoient  $(F_i)_{1 \leq i \leq p}$  une famille de sous- $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de  $E$ . $F_1, \dots, F_p$  sont en somme directe ssi

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{i=1}^p F_i, \quad \sum_{i=1}^p x_i = 0_E \implies x_1 = \dots = x_p = 0_E$$

**Proposition 9** ThéorèmeL'ensemble des translations de  $E$  noté  $\mathcal{T}(E)$  est un groupe abélien pour la composition.**À savoir faire**

- Tous les exercices sur les développements limités
- Savoir montrer qu'un ensemble donné est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de référence ( $\mathbb{K}^n$ ,  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ ,  $\mathbb{K}[X]$ ,  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, E)$ , ...)
- Montrer qu'une somme de deux sous-espaces est directe : on montre que l'intersection est réduite au singleton  $\{0_E\}$

**Ce qu'en dit le programme****Espaces vectoriels et applications linéaires***Les objectifs de cette section sont les suivants :*

- *acquérir les notions de base relatives aux espaces vectoriels et à l'indépendance linéaire;*
- *reconnaître les problèmes linéaires et les traduire à l'aide des notions d'espace vectoriel et d'application linéaire;*
- *définir la notion de dimension, qui décrit le nombre de degrés de liberté d'un problème linéaire ; on insistera sur les méthodes de calcul de dimension et on fera apparaître que ces méthodes reposent sur deux types de représentation : paramétrisation linéaire d'un sous-espace, description d'un sous-espace par équations linéaires;*
- *présenter quelques notions de géométrie affine, afin d'interpréter géométriquement certaines situations.*

*En petite dimension, l'intuition géométrique permet d'interpréter les notions de l'algèbre linéaire, ce qui facilite leur extension au cas général ; on en tirera parti par de nombreuses figures.**Le corps  $\mathbb{K}$  est égal à  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Tout développement théorique sur les espaces de dimension infinie est hors programme.***A - Espaces vectoriels**

## CONTENUS

## CAPACITÉS &amp; COMMENTAIRES

**a) Espaces vectoriels**

Structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.	Espaces $\mathbb{K}^n$ , $\mathbb{K}[X]$ , $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .
Produit d'un nombre fini de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.	Espace $\mathbb{K}^\Omega$ , cas particulier $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .
Espace vectoriel des fonctions d'un ensemble dans un espace vectoriel.	
Famille presque nulle (ou à support fini) de scalaires, combinaison linéaire d'une famille de vecteurs.	On commence par la notion de combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs.

**b) Sous-espaces vectoriels**

Sous-espace vectoriel : définition, caractérisation.	Sous-espace nul. Droite vectorielle. Plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ .
Intersection d'une famille de sous-espaces vectoriels.	Sous-espace $\mathbb{K}_n[X]$ de $\mathbb{K}[X]$ . Ensemble des solutions d'un système linéaire homogène.
Sous-espace vectoriel engendré par une partie $A$ .	Notations $\text{vect}(A)$ , $\text{vect}(x_i)_{i \in I}$ . Tout sous-espace vectoriel contenant $A$ contient $\text{vect}(A)$ .

**c) Familles de vecteurs : Pas pour le moment****d) Somme de deux sous-espaces**

Somme de deux sous-espaces.	
Somme directe de deux sous-espaces. Caractérisation par l'intersection.	La somme $F + G$ est directe si la décomposition de tout vecteur de $F + G$ comme somme d'un élément de $F$ et d'un élément de $G$ est unique.
Sous-espaces supplémentaires.	On incite les étudiants à se représenter des espaces supplémentaires par une figure en dimension 2 et 3.
Somme d'un nombre fini de sous-espaces.	
Somme directe d'un nombre fini de sous-espaces. Caractérisation par l'unicité de la décomposition du vecteur nul.	La somme $F_1 + \dots + F_p$ est directe si la décomposition de tout vecteur de $F_1 + \dots + F_p$ sous la forme $x_1 + \dots + x_p$ avec $x_i \in F_i$ est unique.

**Applications linéaires : a) Généralités**

Application linéaire.