

# **Cahier de calcul**

— Pratique et entraînement —

---

Ce cahier de calcul a été écrit collectivement.

## Coordination

Colas BARDAVID

## Équipe des participants

Vincent BAYLE, Romain BASSON, Olivier BERTRAND, Ménard BOURGADE, Julien BUREAUX, Alain CAMANES, Mathieu CHARLOT, Mathilde COLIN DE VERDIÈRE, Keven COMMAULT, Miguel CONCY, Rémy EUPHERTE, Hélène GROS, Audrey HECHNER, Florian HECHNER, Marie HÉZARD, Nicolas LAILLET, Valérie LE BLANC, Thierry LIMOGES, Quang-Thai NGO, Xavier PELLEGRIN, Fabien PELLEGRINI, Jean-Louis POURTIER, Valérie ROBERT, Jean-Pierre TÉCOURT, Guillaume TOMASINI, Marc TENTI

Le pictogramme  de l'horloge a été créé par Ralf SCHMITZER (The Noun Project).

La photographie de la couverture vient de Wikipedia.

*Version 11 — 23 juin 2022*

# Sommaire

□ 1. Fractions .....	4
□ 2. Puissances .....	6
□ 3. Calcul littéral .....	7
□ 4. Racines carrées .....	9
□ 5. Expressions algébriques .....	11
□ 6. Équations du second degré .....	13
□ 7. Exponentielle et logarithme .....	16
□ 8. Trigonométrie .....	19
□ 9. Dérivation .....	22
□ 10. Primitives .....	25
□ 11. Calcul d'intégrales .....	28
□ 12. Intégration par parties .....	31
□ 13. Nombres complexes .....	33
□ 14. Trigonométrie et nombres complexes .....	35
Réponses et corrigés .....	39

# Présentation et mode d'emploi

## Qu'est-ce que ce cahier ?

Ce cahier est un cahier de calcul, basé sur le programme de mathématiques collège/lycée ainsi que sur le programme de première année post-Bac. Il ne se substitue en aucun cas aux TD donnés par votre professeur de maths mais est un outil pour vous aider à vous améliorer en calcul.

## À quoi sert-il ?

En mathématiques, la technique et le calcul sont fondamentaux.

Sans technique, il est impossible de correctement appréhender une question mathématique. De même que l'on doit faire des gammes et beaucoup pratiquer lorsque l'on apprend un instrument, on doit calculer régulièrement lorsque l'on pratique les mathématiques, notamment en CPGE et dans les études post-Bac.

## Comment est-il organisé ?

Ce cahier comporte plusieurs parties :

- Un sommaire vous permettant de voir d'un seul coup d'œil les différentes fiches et de noter celles que vous avez déjà faites ou pas.
- Une partie de **calculs élémentaires**, faisables dès le début de la première année, centrée sur les calculs « de base » : développement, factorisation, racines carrées, fractions, *etc*. Cela peut vous paraître simple, mais sachez que ce type d'erreur de calcul est toujours fréquent, même en spé, même sur les copies de concours. Travailler les techniques élémentaires de calcul vous facilitera grandement la vie !
- Une partie liée au programme de première année : sont indiqués précisément les chapitres nécessaires pour pouvoir aborder chaque fiche de calcul.
- Les réponses brutes ainsi que les corrigés détaillés, qui sont à la fin du cahier.

Chaque fiche de calcul est organisée ainsi :

- Une présentation du thème de la fiche et des prérequis (notamment, pour des techniques propres à certaines filières, on précise de quelle filière il s'agit)
- Une liste de calculs, dont le temps de résolution (incluant la longueur et la technicité du calcul) est symbolisé par une (⌚⌚⌚⌚), deux (⌚⌚⌚⌚⌚⌚), trois (⌚⌚⌚⌚⌚⌚⌚⌚) ou quatre (⌚⌚⌚⌚⌚⌚⌚⌚) horloges.
- Vous êtes invité à écrire directement les réponses dans les cadres prévus à cet effet.

## Comment l'utiliser ?

### Un travail personnalisé.

Ce cahier de calcul est prévu pour être **utilisé en autonomie**.

Choisissez les calculs que vous faites en fonction des difficultés que vous rencontrez et des chapitres que vous étudiez, ou bien en fonction des conseils de votre professeur de mathématiques.

Pensez aussi à l'utiliser à l'issue d'un DS ou d'une colle, lorsque vous vous êtes rendu compte que certains points de calcul étaient mal maîtrisés.

Enfin, ne cherchez pas à faire linéairement ce cahier : les fiches ne sont pas à faire dans l'ordre, mais en fonction des points que vous souhaitez travailler.

### Un travail régulier.

Essayez de pratiquer les calculs à un rythme régulier : **une quinzaine de minutes par jour** par exemple. Privilégiez un travail régulier sur le long terme plutôt qu'un objectif du type « faire 10 fiches par jour pendant les vacances » .

Point important : pour réussir à calculer, il faut répéter. C'est pour cela que nous avons mis plusieurs exemples illustrant chaque technique de calcul.

Il peut être utile de parfois refaire certains calculs : n'hésitez pas à cacher les réponses déjà écrites dans les cadres, ou à écrire vos réponses dans les cadres au crayon à papier.

### Un travail efficace.

Attention à l'utilisation des réponses et des corrigés : il est important de chercher suffisamment par vous-même avant de regarder les réponses et/ou les corrigés. Il faut vraiment **faire les calculs** afin que le corrigé vous soit profitable.

N'hésitez pas à ne faire qu'en partie une feuille de calculs : il peut être utile de revenir plusieurs fois à une même feuille, afin de voir à quel point telle technique a bien été assimilée.

## La progression

Avoir une solide technique de calcul s'acquiert sur le long terme, mais si vous étudiez sérieusement les fiches de ce cahier, vous verrez assez rapidement des progrès apparaître, en colle, en DS, *etc*. Une bonne connaissance du cours combinée à une plus grande aisance en calcul, c'est un très beau tremplin vers la réussite en prépa ou dans vos études !

## Une erreur ? Une remarque ?

Si jamais vous voyez une erreur d'énoncé ou de corrigé, ou bien si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à écrire à l'adresse [cahierdecalcul@gmail.com](mailto:cahierdecalcul@gmail.com). Si vous pensez avoir décelé une erreur, merci de donner aussi l'identifiant de la fiche, écrit en gris clair en haut à droite de chaque fiche.

# Énoncés





## Fractions

### Prérequis

Règles de calcul sur les fractions.

## Calculs dans l'ensemble des rationnels

### Calcul 1.1 — Simplification de fractions.



Simplifier les fractions suivantes (la lettre  $k$  désigne un entier naturel non nul).

a) $\frac{32}{40}$ .....	<input type="text"/>	c) $\frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4}$ .....	<input type="text"/>
b) $8^3 \times \frac{1}{4^2}$ .....	<input type="text"/>	d) $\frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}}$ .....	<input type="text"/>

### Calcul 1.2 — Sommes, produits, quotients, puissances.



Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible.

a) $\frac{2}{4} - \frac{1}{3}$ .....	<input type="text"/>	c) $\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5$ .....	<input type="text"/>
b) $\frac{2}{3} - 0,2$ .....	<input type="text"/>	d) $-\frac{2}{15} \div \left(-\frac{6}{5}\right)$ .....	<input type="text"/>

### Calcul 1.3



Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible.

a) $(2 \times 3 \times 5 \times 7) \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right)$ .....	<input type="text"/>
b) $\left( \frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10} \right) \times \frac{21}{24}$ .....	<input type="text"/>
c) $\frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3}$ .....	<input type="text"/>
d) $\frac{1\ 978 \times 1\ 979 + 1\ 980 \times 21 + 1958}{1\ 980 \times 1\ 979 - 1\ 978 \times 1\ 979}$ .....	<input type="text"/>

### Calcul 1.4 — Un petit calcul.



Écrire  $\frac{0,5 - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{0,5 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - 0,2}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - 3,5}$  sous forme d'une fraction irréductible. .....

### Calcul 1.5 — Le calcul littéral à la rescousse.



En utilisant les identités remarquables et le calcul littéral, calculer les nombres suivants.

a) $\frac{2\ 022}{(-2\ 022)^2 + (-2\ 021)(2\ 023)}$ .....	<input type="text"/>	c) $\frac{1\ 235 \times 2\ 469 - 1\ 234}{1\ 234 \times 2\ 469 + 1\ 235}$ .....	<input type="text"/>
b) $\frac{2\ 021^2}{2\ 020^2 + 2\ 022^2 - 2}$ .....	<input type="text"/>	d) $\frac{4\ 002}{1\ 000 \times 1\ 002 - 999 \times 1\ 001}$ .....	<input type="text"/>

### Calcul 1.6 — Les fractions et le calcul littéral.



Mettre sous la forme d'une seule fraction, qu'on écrira sous la forme la plus simple possible.

a)  $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$  .....

b)  $\frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b}$  pour  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ , distincts deux à deux. .....

c)  $\frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}}$  pour  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ . .....

### Calcul 1.7 — Le quotient de deux sommes de Gauss.



Simplifier  $\frac{\sum_{k=0}^{n^2} k}{\sum_{k=0}^n k}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , en utilisant la formule  $1 + 2 + \dots + p = \frac{p(p+1)}{2}$ . .....

### Calcul 1.8 — Décomposition en somme d'une partie entière et d'une partie décimale.



Soit  $k \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  et  $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . Écrire les fractions suivantes sous la forme  $a + \frac{b}{X}$  avec  $a$  et  $b$  entiers et  $X \in \mathbb{R}$ .

a)  $\frac{29}{6}$  .....

b)  $\frac{k}{k-1}$  .....

c)  $\frac{3x-1}{x-2}$  ..

### Calcul 1.9 — Un produit de fractions.



Soit  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . On donne  $A = \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(1+t)^2}$  et  $B = (1+t^2)(1+t)^2$ .

Simplifier  $AB$  autant que possible. .....

## Comparaison

### Calcul 1.10 — Règles de comparaison.



Comparer les fractions suivantes avec le signe «  $>$  », «  $<$  » ou «  $=$  ».

a)  $\frac{3}{5} \cdots \frac{5}{9}$  .....

b)  $\frac{12}{11} \cdots \frac{10}{12}$  .....

c)  $\frac{125}{25} \cdots \frac{105}{21}$  .....

### Calcul 1.11 — Produit en croix.



Les nombres  $A = \frac{33\ 215}{66\ 317}$  et  $B = \frac{104\ 348}{208\ 341}$  sont-ils égaux ? Oui ou non ? .....

### Calcul 1.12 — Produit en croix.



On pose  $A = \frac{100\ 001}{1\ 000\ 001}$  et  $B = \frac{1\ 000\ 001}{10\ 000\ 001}$  : a-t-on  $A > B$ ,  $A = B$  ou  $A < B$  ? .....

## Réponses mélangées

$\frac{-1}{n(n+1)^2}$	$-\frac{ab}{a-b}$	2	3	$\frac{12}{11} > \frac{10}{12}$	$\frac{1}{2}$	247	$\frac{n^3+n}{n+1}$	1 000	$\frac{1}{9}$
$2t$	$2\ 022$	$\frac{-10}{3}$	$\frac{4}{5}$	$3 + \frac{5}{x-2}$	$\frac{3}{2}n$	$\frac{203}{24}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{5} > \frac{5}{9}$
$4 + \frac{5}{6}$	$A > B$	1	$\frac{16}{35}$	$2^5$	$-2 \times 3^{3k-2}$	Non	$1 + \frac{1}{k-1}$	$\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$	9

► Réponses et corrigés page 39

## Puissances

### Prérequis

Opérations sur les puissances (produits, quotients), décomposition en facteurs premiers, sommes d'expressions fractionnaires (même dénominateur), identités remarquables, factorisations et développements simples.

### Calcul 2.1



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme d'une puissance de 10.

a)  $10^5 \cdot 10^3$  .....

c)  $\frac{10^5}{10^3}$  .....

e)  $\frac{(10^5 \cdot 10^{-3})^5}{(10^{-5} \cdot 10^3)^{-3}}$  .....

b)  $(10^5)^3$  .....

d)  $\frac{10^{-5}}{10^{-3}}$  .....

f)  $\frac{(10^3)^{-5} \cdot 10^5}{10^3 \cdot 10^{-5}}$  .....

### Calcul 2.2



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme  $a^n$  avec  $a$  et  $n$  deux entiers relatifs.

a)  $3^4 \cdot 5^4$  .....

c)  $\frac{2^5}{2^{-2}}$  .....

e)  $\frac{6^5}{2^5}$  .....

b)  $(5^3)^{-2}$  .....

d)  $(-7)^3 \cdot (-7)^{-5}$  .....

f)  $\frac{(30^4)^7}{2^{28} \cdot 5^{28}}$  .....

### Calcul 2.3



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme  $2^n \cdot 3^p$ , où  $n$  et  $p$  sont deux entiers relatifs.

a)  $\frac{2^3 \cdot 3^2}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 6^{-1}}$  .....

c)  $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}}$  .....

b)  $2^{21} + 2^{22}$  .....

d)  $\frac{(3^2 \cdot (-2)^4)^8}{((-3)^5 \cdot 2^3)^{-2}}$  .....

### Calcul 2.4



Dans chaque cas, simplifier au maximum.

a)  $\frac{8^{17} \cdot 6^{-6}}{9^{-3} \cdot 2^{42}}$  .....

c)  $\frac{12^{-2} \cdot 15^4}{25^2 \cdot 18^{-4}}$  .....

b)  $\frac{55^2 \cdot 121^{-2} \cdot 125^2}{275 \cdot 605^{-2} \cdot 25^4}$  .....

d)  $\frac{36^3 \cdot 70^5 \cdot 10^2}{14^3 \cdot 28^2 \cdot 15^6}$  .....

### Calcul 2.5



Dans chaque cas, simplifier au maximum l'expression en fonction du réel  $x$ .

a)  $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$  .....

c)  $\frac{x^2}{x^2-x} + \frac{x^3}{x^3+x^2} - \frac{2x^2}{x^3-x}$  .....

b)  $\frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4}$  .....

d)  $\frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x}$  .....

### Réponses mélangées

$\frac{x}{x+1}$	$15^4$	$\frac{2x}{x+1}$	$2^{21} \cdot 3$	$10^{15}$	11	$5^{-6}$	$2^{38} \cdot 3^{26}$
$10^2$	$10^8$	$10^{-2}$	$2^{-4} \cdot 3^{-1}$	$2^6 \cdot 5$	$3^5$	$(-7)^{-2}$	
$\frac{2}{x-2}$	$10^4$	8	$2^7$	$10^{-8}$	$3^{10}$	$\frac{1}{x-2}$	$3^{28}$

► Réponses et corrigés page 42

## Calcul littéral

### Prérequis

Les identités remarquables.

## Développer, réduire et ordonner

Dans cette section, on tâchera de mener les calculs avec le minimum d'étapes. Idéalement, on écrira directement le résultat. La variable  $x$  représente un nombre réel (ou complexe).

### Calcul 3.1

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes selon les puissances décroissantes de  $x$ .

a) $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^3$ ....	<input type="text"/>	d) $(x + 1)^2(x - 1)(x^2 + x + 1)$ ....	<input type="text"/>
b) $(x - 1)^3(x^2 + x + 1)$ ....	<input type="text"/>	e) $(x - 1)^2(x + 1)(x^2 + x + 1)$ ....	<input type="text"/>
c) $(x + 1)^2(x - 1)(x^2 - x + 1)$ ....	<input type="text"/>	f) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ ....	<input type="text"/>

### Calcul 3.2

Développer, réduire et ordonner les expressions polynomiales suivantes selon les puissances croissantes de  $x$ .

a) $(x - 2)^2(-x^2 + 3x - 1) - (2x - 1)(x^3 + 2)$ ....	<input type="text"/>
b) $(2x + 3)(5x - 8) - (2x - 4)(5x - 1)$ ....	<input type="text"/>
c) $\left((x + 1)^2(x - 1)(x^2 - x + 1) + 1\right)x - x^6 - x^5 + 2$ ....	<input type="text"/>
d) $(x + 1)(x - 1)^2 - 2(x^2 + x + 1)$ ....	<input type="text"/>
e) $(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(1 - \sqrt{2}x + x^2)$ ....	<input type="text"/>
f) $(x^2 + x + 1)^2$ ....	<input type="text"/>

## Factoriser

### Calcul 3.3 — Petite mise en jambe.

Factoriser les expressions polynomiales de la variable réelle  $x$  suivantes.

a) $-(6x + 7)(6x - 1) + 36x^2 - 49$ ....	<input type="text"/>
b) $25 - (10x + 3)^2$ ....	<input type="text"/>
c) $(6x - 8)(4x - 5) + 36x^2 - 64$ ....	<input type="text"/>
d) $(-9x - 8)(8x + 8) + 64x^2 - 64$ ....	<input type="text"/>

### Calcul 3.4 — À l'aide de la forme canonique.



Factoriser les polynômes de degré deux suivants en utilisant leur forme canonique. On rappelle que la forme

canonique de  $ax^2 + bx + c$  est  $a \left[ \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$  (où  $a \neq 0$ ).

a)  $x^2 - 2x + 1$  .....

d)  $3x^2 + 7x + 1$  .....

b)  $x^2 + 4x + 4$  .....

e)  $2x^2 + 3x - 28$  .....

c)  $x^2 + 3x + 2$  .....

f)  $-5x^2 + 6x - 1$  .....

### Calcul 3.5 — Avec plusieurs variables.



Factoriser sur  $\mathbb{R}$  les expressions polynomiales suivantes dont les variables représentent des nombres réels.

a)  $(x + y)^2 - z^2$  .....

d)  $xy - x - y + 1$  .....

b)  $x^2 + 6xy + 9y^2 - 169x^2$  .....

e)  $x^3 + x^2y + 2x^2 + 2xy + x + y$  .....

c)  $xy + x + y + 1$  .....

f)  $y^2(a^2 + b^2) + 16x^4(-a^2 - b^2)$  .....

### Calcul 3.6 — On passe au niveau supérieur.



Factoriser sur  $\mathbb{R}$  les expressions polynomiales suivantes dont les variables représentent des nombres réels.

a)  $x^4 - 1$  .....

.....

b)  $(-9x^2 + 24)(8x^2 + 8) + 64x^4 - 64$  .....

.....

c)  $x^4 + x^2 + 1$  .....

.....

d)  $(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$  .....

.....

e)  $(ap + bq + cr + ds)^2 + (aq - bp - cs + dr)^2 + (ar + bs - cp - dq)^2 + (as - br + cq - dp)^2$  .....

.....

#### Réponses mélangées

$$1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4 \quad (a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2) \quad (x + 1)(x + 2)$$

$$2 + x^3 - x^4 - x^5 \quad x^5 - x^3 - x^2 + 1 \quad (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$2 \left( x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4} \right) \left( x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4} \right) \quad 2(3x - 4)(10x + 3) \quad 1 + x^4 \quad (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$$

$$(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(p^2 + q^2 + r^2 + s^2) \quad (x + y - z)(x + y + z) \quad 4(5x + 4)(-5x + 1)$$

$$-1 - 3x - 3x^2 + x^3 \quad x^4 + x^2 + 1 \quad 3(14x + 3y)(-4x + y) \quad (x + 1)(y + 1)$$

$$x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1 \quad (x - 1)^2 \quad (x + y)(x + 1)^2 \quad -6(6x + 7)$$

$$8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8} \quad -5(x - 1) \left( x - \frac{1}{5} \right) \quad (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad (x - 1)(y - 1) \quad (x + 2)^2$$

$$-2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4 \quad x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1 \quad x^5 - x^3 + x^2 - 1 \quad -28 + 21x$$

$$-8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4) \quad 3 \left( x + \frac{7 - \sqrt{37}}{6} \right) \left( x + \frac{7 + \sqrt{37}}{6} \right) \quad -8(x + 1)(x + 16)$$

► Réponses et corrigés page 44

## Racines carrées

### Prérequis

Racines carrées. Méthode de la quantité conjuguée.

## Premiers calculs

### Calcul 4.1 — Définition de la racine carrée.



Simplifier les expressions suivantes en simplifiant les symboles  $\sqrt{\cdot}$  qui peuvent l'être (et en prenant à ne pas se tromper sur les signes).

a) $\sqrt{(-5)^2}$ .....	<input type="text"/>	d) $\sqrt{(2 - \sqrt{7})^2}$ .....	<input type="text"/>
b) $\sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2}$ .....	<input type="text"/>	e) $\sqrt{(3 - \pi)^2}$ .....	<input type="text"/>
c) $\sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2}$ .....	<input type="text"/>	f) $\sqrt{(3 - a)^2}$ .....	<input type="text"/>

### Calcul 4.2 — Transformation d'écriture.



Écrire aussi simplement que possible les expressions suivantes.

a) $(2\sqrt{5})^2$ .....	<input type="text"/>	e) $(3 + \sqrt{7})^2 - (3 - \sqrt{7})^2$ .....	<input type="text"/>
b) $(2 + \sqrt{5})^2$ .....	<input type="text"/>	f) $(\sqrt{2\sqrt{3}})^4$ .....	<input type="text"/>
c) $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$ .....	<input type="text"/>	g) $\left(\frac{5 - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2$ .....	<input type="text"/>
d) $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$ .....	<input type="text"/>	h) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$ .....	<input type="text"/>

## Avec la méthode de la quantité conjuguée

### Calcul 4.3



Rendre rationnels les dénominateurs des expressions suivantes.

a) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}}$ .....	<input type="text"/>	e) $\frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$ .....	<input type="text"/>
b) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$ .....	<input type="text"/>	f) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}}$ .....	<input type="text"/>
c) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$ .....	<input type="text"/>	g) $\frac{5 + 2\sqrt{6}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{5 - 2\sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$ .....	<input type="text"/>
d) $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ .....	<input type="text"/>	h) $\left(\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3} + 1}\right)^2$ .....	<input type="text"/>

**Calcul 4.4**

Exprimer la quantité suivante sans racine carrée au dénominateur.

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$$

**Calculs variés****Calcul 4.5 — Avec une variable.**On considère la fonction  $f$  qui à  $x > 1$  associe  $f(x) = \sqrt{x-1}$ .Pour tout  $x > 1$ , calculer et simplifier les expressions suivantes.

a)  $f(x) + \frac{1}{f(x)} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

d)  $\frac{f'(x)}{f(x)} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

b)  $\frac{f(x+2) - f(x)}{f(x+2) + f(x)} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

e)  $f(x) + 4f''(x) \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

c)  $\sqrt{x+2f(x)} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

f)  $\frac{f(x)}{f''(x)} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

**Calcul 4.6 — Mettre au carré.**

Élever les quantités suivantes au carré pour en donner une expression simplifiée.

a)  $\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

b)  $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

**Calcul 4.7 — Méli-mélo.**

Donner une écriture simplifiée des réels suivants.

a)  $\frac{3 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

d)  $3e^{-\frac{1}{2} \ln 3} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

b)  $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

e)  $2\sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

c)  $\sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

f)  $\frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} \dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$

**Calcul 4.8**On note  $A = \sqrt[3]{3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}} - \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}}$ . Simplifier  $A$ On commencera par exprimer  $A^3$  en fonction de  $A$ .  $\dots \quad \boxed{\hspace{2cm}}$ **Réponses mélangées**

$$\begin{array}{llllll}
12\sqrt{7} & -4(x-1)^2 & -(\sqrt{2} + \sqrt{3}) & 9 - \frac{10}{3}\sqrt{2} & 20 & -\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{2} \\
\sqrt{2} & 1 + \sqrt{5} & 2\sqrt{2} & \frac{x}{\sqrt{x-1}} & |3-a| & 50 - 25\sqrt{3} \\
\sqrt{3} - 1 & 3 + \sqrt{2} & 1 + \sqrt{2} & 2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6} & 5 & \frac{1}{2} \frac{1}{x-1} \\
\frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}} & \sqrt{3} & \sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2 & 1 & 2\sqrt{2} & 9 + 4\sqrt{5} \\
\ln(1 + \sqrt{2}) & 1 + \sqrt{3} & -\sqrt{3} + 2 & \pi - 3 & 12 & \sqrt{7} - 2 \\
1 + \sqrt{2} & -11 + 5\sqrt{5} & x - \sqrt{x^2 - 1} & 10 & \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4} & 1 - \sqrt{10} + \sqrt{15}
\end{array}$$

► Réponses et corrigés page 46

## Expressions algébriques

### Prérequis

Identités remarquables.

## Équations polynomiales

### Calcul 5.1 — Cubique.



Soit  $a$  un nombre réel tel que  $a^3 - a^2 + 1 = 0$ .

Exprimer les quantités suivantes sous la forme  $xa^2 + ya + z$  où  $x, y, z$  sont trois nombres rationnels.

a)  $(a + 2)^3$  .....

c)  $a^{12}$  .....

b)  $a^5 - a^6$  .....

d)  $\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$  .....

### Calcul 5.2 — Introduction aux nombres complexes.



Soit  $i$  un nombre tel que  $i^2 = -1$ .

Exprimer les quantités suivantes sous la forme  $x + iy$  où  $x, y$  sont deux réels.

a)  $(3 + i)^2$  .....

c)  $(3 - i)^3$  .....

b)  $(3 - i)^2$  .....

d)  $(3 - 2i)^3$  .....

### Calcul 5.3



Même exercice.

a)  $(4 - 5i)(6 + 3i)$  .....

c)  $(-4 + i\sqrt{5})^3$  .....

b)  $(2 + 3i)^3(2 - 3i)^3$  .....

d)  $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$  .....

### Calcul 5.4 — Puissance cinquième.



Soit  $a$  un nombre distinct de 1 tel que  $a^5 = 1$ . Calculer les nombres suivants :

a)  $a^7 - 3a^6 + 4a^5 - a^2 + 3a - 1$  .....

b)  $a^{1234} \times a^{2341} \times a^{3412} \times a^{4123}$  .....

c)  $\prod_{k=0}^{1234} a^k$  .....

d)  $1 + a + a^2 + a^3 + a^4$  .....

e)  $\sum_{k=1}^{99} a^k$  .....

f)  $\prod_{k=0}^4 (2 - a^k)$  .....

## Expressions symétriques

### Calcul 5.5 — Inverse.



Soit  $x$  un réel non nul. On pose  $a = x - \frac{1}{x}$ . Exprimer les quantités suivantes en fonction de  $a$  uniquement.

a)  $x^2 + \frac{1}{x^2} \dots \boxed{\quad}$

b)  $x^3 - \frac{1}{x^3} \dots \boxed{\quad}$

c)  $x^4 + \frac{1}{x^4} \dots \boxed{\quad}$

### Calcul 5.6 — Trois variables.



Soient  $x, y, z$  trois nombres deux à deux distincts. On pose

$$a = x + y + z, \quad b = xy + yz + zx \quad \text{et} \quad c = xyz.$$

Exprimer les quantités suivantes en fonction de  $a, b, c$  uniquement.

a)  $x^2 + y^2 + z^2 \dots \boxed{\quad}$

b)  $x^2(y+z) + y^2(z+x) + z^2(x+y) \dots \boxed{\quad}$

c)  $x^3 + y^3 + z^3 \dots \boxed{\quad}$

d)  $(x+y)(y+z)(z+x) \dots \boxed{\quad}$

e)  $x^2yz + y^2zx + z^2xy \dots \boxed{\quad}$

f)  $x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 \dots \boxed{\quad}$

### Calcul 5.7



Même exercice.

a)  $x^3(y+z) + y^3(z+x) + z^3(x+y) \dots \boxed{\quad}$

b)  $x^4 + y^4 + z^4 \dots \boxed{\quad}$

c)  $\frac{x}{(x-y)(x-z)} + \frac{y}{(y-z)(y-x)} + \frac{z}{(z-x)(z-y)} \dots \boxed{\quad}$

d)  $\frac{x^2}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^2}{(y-z)(y-x)} + \frac{z^2}{(z-x)(z-y)} \dots \boxed{\quad}$

e)  $\frac{x^3}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^3}{(y-z)(y-x)} + \frac{z^3}{(z-x)(z-y)} \dots \boxed{\quad}$

### Réponses mélangées

$$-4 + 43i\sqrt{5} \quad a^4 + 4a^2 + 2 \quad ab - c \quad -1 \quad -9 - 46i \quad a^3 + 3a \quad 7a^2 + 12a + 7$$

$$39 - 18i \quad 18 - 26i \quad 8 - 6i \quad a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2 \quad a^2 + 2 \quad 3 \quad 1$$

$$8 + 6i \quad ac \quad 1 \quad 0 \quad 31 \quad a \quad a^2 - 1 \quad 1 \quad 2197 \quad a^2b - ac - 2b^2$$

$$-a^2 + 1 \quad -2ac + b^2 \quad ab - 3c \quad 0 \quad a^2 - 2b \quad 4a^2 - a - 3 \quad 1 \quad a^3 - 3ab + 3c$$

► Réponses et corrigés page 48

## Équations du second degré

### Prérequis

Relations entre coefficients et racines.

Dans cette fiche :

- tous les trinômes considérés sont réels ;
- on ne s'intéresse qu'à leurs éventuelles **racines réelles** ;
- tous les paramètres sont choisis de telle sorte que l'équation considérée soit bien de degré 2.

Les formules donnant explicitement les racines d'une équation du second degré en fonction du discriminant **ne servent nulle part** dans cette fiche d'exercices !

### Recherche de racines

#### Calcul 6.1 — Des racines vraiment évidentes.



Résoudre mentalement les équations suivantes. *Les racines évidentes sont à chercher parmi 0, 1, -1, 2, -2 ainsi éventuellement que 3 et -3.*

a)  $x^2 - 6x + 9 = 0$  .....

f)  $2x^2 + 3x = 0$  .....

b)  $9x^2 + 6x + 1 = 0$  .....

g)  $2x^2 + 3 = 0$  .....

c)  $x^2 + 4x - 12 = 0$  .....

h)  $x^2 + 4x - 5 = 0$  .....

d)  $x^2 - 5x + 6 = 0$  .....

i)  $3x^2 - 11x + 8 = 0$  .....

e)  $x^2 - 5x = 0$  .....

j)  $5x^2 + 24x + 19 = 0$  .....

#### Calcul 6.2 — Somme et produit.



Résoudre mentalement les équations suivantes.

a)  $x^2 - 13x + 42 = 0$  .....

d)  $x^2 - 8x - 33 = 0$  .....

b)  $x^2 + 8x + 15 = 0$  .....

e)  $x^2 - (a + b)x + ab = 0$  .....

c)  $x^2 + 18x + 77 = 0$  .....

f)  $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$  .....

#### Calcul 6.3 — L'une grâce à l'autre.



Calculer la seconde racine des équations suivantes.

a)  $3x^2 - 14x + 8 = 0$  sachant que  $x = 4$  est racine .....

b)  $7x^2 + 23x + 6 = 0$  sachant que  $x = -3$  est racine .....

c)  $mx^2 + (2m + 1)x + 2 = 0$  sachant que  $x = -2$  est racine .....

d)  $(m + 3)x^2 - (m^2 + 5m)x + 2m^2 = 0$  sachant que  $x = m$  est racine .....

#### Calcul 6.4 — Racine évidente.



Trouver une racine des équations suivantes et calculer l'autre en utilisant les relations entre les coefficients du trinôme et ses racines.

Seuls les deux derniers calculs ne se font pas de tête.

a)  $(b - c)x^2 + (c - a)x + (a - b) = 0$  .....

b)  $a(b - c)x^2 + b(c - a)x + c(a - b) = 0$  .....

c)  $(x + a)(x + b) = (m + a)(m + b)$  .....

d)  $(b - c)x^2 + (c - a)mx + (a - b)m^2 = 0$  .....

e)  $\frac{x}{a} + \frac{b}{x} = \frac{m}{a} + \frac{b}{m}$  .....

f)  $\frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$  .....

### Recherche d'équations



#### Calcul 6.5 — À la recherche de l'équation.

En utilisant la somme et le produit des racines d'une équation du second degré, former l'équation du second degré admettant comme racines les nombres suivants.

a) 9 et 13 .....

b) -11 et 17 .....

c)  $2 + \sqrt{3}$  et  $2 - \sqrt{3}$  .....

d)  $m + \sqrt{m^2 - 3}$  et  $m - \sqrt{m^2 - 3}$  .....

e)  $m + 3$  et  $\frac{2m - 5}{2}$  .....

f)  $\frac{m + 1}{m}$  et  $\frac{m - 2}{m}$  .....

#### Calcul 6.6 — Avec le discriminant.



Déterminer la valeur à donner à  $m$  pour que les équations suivantes admettent une racine double, et préciser la valeur de la racine dans ce cas.

a)  $x^2 - (2m + 3)x + m^2 = 0$  .....

b)  $(m + 2)x^2 - 2(m - 1)x + 4 = 0$  .....

c)  $(m + 3)x^2 + 2(3m + 1)x + (m + 3) = 0$  .....

## Factorisations et signe

### Calcul 6.7 — Factorisation à vue.



Déterminer de tête les valeurs des paramètres  $a$  et  $b$  pour que les égalités suivantes soient vraies pour tout  $x$ .

a)  $2x^2 + 7x + 6 = (x + 2)(ax + b)$  .....

b)  $-4x^2 + 4x - 1 = (2x - 1)(ax + b)$  .....

c)  $-3x^2 + 14x - 15 = (x - 3)(ax + b)$  .....

d)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{2}x - 40 = (x - 5)(ax + b)$  .....

e)  $x^2 + 2\sqrt{7}x - 21 = (x - \sqrt{7})(ax + b)$  .....

### Calcul 6.8 — Signe d'un trinôme.



Déterminer l'ensemble des valeurs de  $x$  pour lesquelles les expressions suivantes sont positives ou nulles.

a)  $x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2}$  .....

b)  $-x^2 + 2x + 15$  .....

c)  $(x + 1)(3x - 2)$  .....

d)  $\frac{x - 4}{2x + 1}$  .....

### Réponses mélangées

$2/3$       $m$  donc  $ab/m$       $m$  donc  $-(m + a + b)$       $a = -3$  et  $b = 5$       $-7, -11$

$x^2 - 22x + 117 = 0$       $]-\infty, -1] \cup [2/3, +\infty[$       $0$ , donc  $5$       $m = 1$  et  $x = -1$  ou  $m = -1$  et  $x = 1$

$[-3, 5]$       $m$  donc  $m(a - b)/(b - c)$       $a = 1/2$  et  $b = 8$       $-3, 11$       $1$  donc  $c(a - b)/(a(b - c))$

$a, b$       $]-\infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$       $-1/m$       $a + b$  puis  $2ab/(a + b)$ .      $1$  donc  $-5$

$6, 7$       $1$  donc  $(a - b)/(b - c)$       $]-\infty, -1/2[ \cup [4, +\infty[$       $2m/(m + 3)$

$-2/7$       $a = 1$  et  $b = 3\sqrt{7}$       $m^2x^2 + (m - 2m^2)x + (m^2 - m - 2) = 0$

$a = -2$  et  $b = 1$       $2, 3$       $a - b, a + b$       $3, 3$       $a = 2$  et  $b = 3$       $1$  donc  $8/3$

$\emptyset$       $m = -3/4$  et  $x = 3/4$       $-3, -5$       $2x^2 - (4m + 1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$

$-1$  donc  $-19/5$       $x^2 - 4x + 1 = 0$       $-1/3, -1/3$       $x^2 - 2mx + 3 = 0$

$0, \text{ donc } -3/2$       $x^2 - 6x - 187 = 0$       $2, -6$       $m = -1$  et  $x = -2$ , ou  $m = 7$  et  $x = 2/3$

► Réponses et corrigés page 51

## Exponentielle et logarithme

### Prérequis

Exponentielle, logarithme.

## Logarithmes

### Calcul 7.1



Calculer les nombres suivants en fonction de  $\ln 2$ ,  $\ln 3$  et  $\ln 5$ .

a)  $\ln 16$  .....

b)  $\ln 512$  .....

c)  $\ln 0,125$  .....

d)  $\frac{1}{8} \ln \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{8}$  .....

e)  $\ln 72 - 2 \ln 3$  .....

f)  $\ln 36$  .....

### Calcul 7.2



Calculer les nombres suivants en fonction de  $\ln 2$ ,  $\ln 3$  et  $\ln 5$ .

a)  $\ln \frac{1}{12}$  .....

b)  $\ln(2,25)$  .....

c)  $\ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln(0,875)$  .....

d)  $\ln 500$  .....

e)  $\ln \frac{16}{25}$  .....

f)  $\ln(6,25)$  .....

### Calcul 7.3



Calculer les nombres suivants en fonction de  $\ln 2$ ,  $\ln 3$  et  $\ln 5$ .

$\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \dots + \ln \frac{98}{99} + \ln \frac{99}{100}$  .....

### Calcul 7.4 — Logarithme et radicaux.



a) On pose  $\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1)$ . Calculer  $(1 + \sqrt{2})^2$  et  $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$ .

En déduire une écriture simplifiée de  $\alpha$  en fonction de  $\ln(\sqrt{2} - 1)$ .....

b) Calculer  $\beta$  sachant que  $\ln \beta = \ln(7 + 5\sqrt{2}) + 8 \ln(\sqrt{2} + 1) + 7 \ln(\sqrt{2} - 1)$  .....

c) Simplifier  $\gamma = \ln((2 + \sqrt{3})^{20}) + \ln((2 - \sqrt{3})^{20})$  .....

d) Simplifier  $\delta = \ln\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$  .....

# Exponentielles

## Calcul 7.5



Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a)  $e^{3 \ln 2}$  .....

d)  $e^{-2 \ln 3}$  .....

b)  $\ln(\sqrt{e})$  .....

e)  $\ln(e^{-\frac{1}{2}})$  .....

c)  $\ln(e^{\frac{1}{3}})$  .....

f)  $e^{\ln 3 - \ln 2}$  .....

## Calcul 7.6



Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a)  $-e^{-\ln \frac{1}{2}}$  .....

d)  $\ln(\sqrt{e^4}) - \ln(\sqrt{e^2})$  .....

b)  $e^{-\ln \ln 2}$  .....

e)  $\ln(\sqrt{\exp(-\ln e^2)})$  .....

c)  $\ln\left(\frac{1}{e^{17}}\right)$  .....

f)  $\exp\left(-\frac{1}{3} \ln(e^{-3})\right)$  .....

# Études de fonctions

## Calcul 7.7 — Parité.



Étudier la parité des fonctions suivantes.

a)  $f_1 : x \mapsto \ln \frac{2021 + x}{2021 - x}$  .....

b)  $f_2 : x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  .....

c)  $f_3 : x \mapsto \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$  .....

d)  $f_4 : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$  .....

## Calcul 7.8 — Étude d'une fonction.



Soit  $f : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ .

a) Préciser l'ensemble de définition de cette fonction. .....

b) Montrer que pour tous réels  $a$  et  $b$  on a  $f(a + b) = \frac{f(a) + f(b)}{1 + f(a)f(b)}$ . .....

c) Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ . .....

d) Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$ . .....

### Calcul 7.9



On considère l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \ln(1+x). \end{cases}$$

Calculer et simplifier les expressions suivantes pour tout  $x \in \mathbb{R}$  pour lequel elles sont définies.

a)  $f(2e^x - 1)$  .....

d)  $xf'(x) - 1$  .....

b)  $e^{x-\frac{1}{2}}f(x)$  .....

e)  $e^{\frac{f(x)}{f'(x-1)}}$  .....

c)  $\frac{1}{2}f(x^2 - 2x)$  .....

## Équations, inéquations

### Calcul 7.10



Résoudre les équations et inéquations suivantes (d'inconnue  $x$ ).

a)  $e^{3x-5} \geq 12$  .....

b)  $1 \leq e^{-x^2+x}$  .....

c)  $e^{1+\ln x} \geq 2$  .....

d)  $e^{-6x} \leq \sqrt{e}$  .....

e)  $\ln(-x-5) = \ln(x-61) - \ln(x+7)$  .....

f)  $\ln(-x-5) = \ln \frac{x-61}{x+7}$  .....

### Réponses mélangées

$\frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$	$\frac{1}{2} \ln 2$	-1	-3 ln 2	8	$2 \ln 5 - 2 \ln 2$	$x \geq \frac{\ln 12 + 5}{3}$
$3 \ln 5 + 2 \ln 2$	$2 \ln 3 - 2 \ln 2$	impaire	$x \geq \frac{2}{e}$	$-2 \ln 5 + 4 \ln 2$	$\mathbb{R}$	$\frac{3}{2}$
$\ln 3 + 11 \ln 2$	1	$x + \ln 2$	$\frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$	impaire	-1	0
$9 \ln 2$	$\frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{1+x}$	3 ln 2	-17	$(1+x)^x$
$\frac{1}{9}$	-2	$-\ln 3 - 2 \ln 2$	$4 \ln 2$	$x \in [0, 1]$	impaire	impaire
$\ln  x-1 $	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{\ln 2}$	0	ok	$17 + 12\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$
					$-2 \ln 2 - 2 \ln 5$	1

► Réponses et corrigés page 53

## Trigonométrie

### Prérequis

Relation  $\cos^2 + \sin^2 = 1$ . Symétrie et périodicité de sin et cos.  
Formules d'addition et de duplication. Fonction tangente.

Dans toute cette fiche,  $x$  désigne une quantité réelle.

## Valeurs remarquables de cosinus et sinus

### Calcul 8.1



Simplifier :

a)  $\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4} + \cos \frac{7\pi}{4}$  .

c)  $\tan \frac{2\pi}{3} + \tan \frac{3\pi}{4} + \tan \frac{5\pi}{6} + \tan \frac{7\pi}{6}$

b)  $\sin \frac{5\pi}{6} + \sin \frac{7\pi}{6}$

d)  $\cos^2 \frac{4\pi}{3} - \sin^2 \frac{4\pi}{3}$

## Propriétés remarquables de cosinus et sinus

### Calcul 8.2



Simplifier :

a)  $\sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

c)  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

b)  $\sin(-x) + \cos(\pi + x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

d)  $\cos(x - \pi) + \sin\left(-\frac{\pi}{2} - x\right)$

## Formules d'addition

### Calcul 8.3



Calculer les quantités suivantes.

a)  $\cos \frac{5\pi}{12}$  (on a  $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$ )

c)  $\sin \frac{\pi}{12}$

b)  $\cos \frac{\pi}{12}$

d)  $\tan \frac{\pi}{12}$

### Calcul 8.4



a) Simplifier :  $\sin(4x) \cos(5x) - \sin(5x) \cos(4x)$

b) Simplifier :  $\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x}$  (pour  $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ )

c) Simplifier :  $\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$

d) Expliciter  $\cos(3x)$  en fonction de  $\cos x$

## Formules de duplication

### Calcul 8.5



En remarquant qu'on a  $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$ , calculer :

a)  $\cos \frac{\pi}{8}$  .....

b)  $\sin \frac{\pi}{8}$  .....

### Calcul 8.6



a) Simplifier :  $\frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)}$  (avec  $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ ) .....

b) Simplifier :  $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$  (pour  $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ ) .....

c) Expliciter  $\cos(4x)$  en fonction de  $\cos x$  .....

## Équations trigonométriques

### Calcul 8.7



Résoudre dans  $[0, 2\pi]$ , dans  $[-\pi, \pi]$ , puis dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a)  $\cos x = \frac{1}{2}$  .....

f)  $|\tan x| = \frac{1}{\sqrt{3}}$  .....

b)  $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  .....

g)  $\cos(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$  .....

c)  $\sin x = \cos \frac{2\pi}{3}$  .....

h)  $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

d)  $\tan x = -1$  .....

i)  $\cos x = \cos \frac{\pi}{7}$  .....

e)  $\cos^2 x = \frac{1}{2}$  .....

j)  $\sin x = \cos \frac{\pi}{7}$  .....

## Inéquations trigonométriques

### Calcul 8.8



Résoudre dans  $[0, 2\pi]$ , puis dans  $[-\pi, \pi]$ , les inéquations suivantes :

a)  $\cos x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$  .....

e)  $\tan x \geq 1$  .....

b)  $\cos x \leq \cos \frac{\pi}{3}$  .....

f)  $|\tan x| \geq 1$  .....

c)  $\sin x \leq \frac{1}{2}$  .....

g)  $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$  .....

d)  $|\sin x| \leq \frac{1}{2}$  .....

h)  $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$  .....

### Réponses mélangées

$[-\pi, -\frac{5\pi}{6}] \cup [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{5\pi}{6}, \pi]$	$\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$	$\left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$	$\left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$	$-1 - \sqrt{3}$	$2 \cos x$	$\frac{1}{\cos x}$
$\left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left\{\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$	$\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}, 2\pi\right]$	$\left[-\pi, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$
$\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$	$\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right]$	0	$\left\{\frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\left\{\frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left\{\frac{5\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{9\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left[-\pi, -\frac{5\pi}{8}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \pi\right]$	$\left\{-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$
$-\sin x$	$\left[0, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi\right]$	$\left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}\right\}$	$\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14}\right]$
$\left\{\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right\}$	$-\sin x$	$\left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right]$	$\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$
$\left\{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$	$4 \cos^3 x - 3 \cos x$	
$8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$	$\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\right\}$	$\left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$	
$\left\{-\frac{11\pi}{12}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right\}$	$\left\{-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}\right\}$	$-2 \cos x$	$\left\{\frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14}\right\}$
$\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$	$\left\{-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}$	$\left\{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	
$\left\{\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$	2	$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right]$
$\left\{\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$	$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$	0	$\left\{\frac{\pi}{7}, \frac{13\pi}{7}\right\}$
$\left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$	$\left\{\frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$	$\left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$	$\tan x$
$\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$	$\left[-\pi, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$	$\left\{-\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{7}\right\}$	$\left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$	0	$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$	$\left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right]$
0	0	$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$	
	$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$		

► Réponses et corrigés page 55

## Dérivation

**Prérequis**

Dérivées des fonctions usuelles. Formules de dérivation.

### Application des formules usuelles

**Calcul 9.1 — Avec des produits.**Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^2 + 3x + 2)(2x - 5)$ . ....

b)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^3 + 3x + 2)(x^2 - 5)$ . ....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^2 - 2x + 6) \exp(2x)$ . ....

d)  $x \in ]2, +\infty[$  et  $f(x) = (3x^2 - x) \ln(x - 2)$  ....

**Calcul 9.2 — Avec des puissances.**Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (x^2 - 5x)^5$ . ....

b)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (2x^3 + 4x - 1)^2$ . ....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (\sin(x) + 2 \cos(x))^2$ . ....

d)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (3 \cos(x) - \sin(x))^3$ . ....

**Calcul 9.3 — Avec des fonctions composées.**Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ . ....

b)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \ln(\ln(x))$ . ....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = (2 - x) \exp(x^2 + x)$ . ....

d)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \exp(3 \sin(2x))$ . ....

**Calcul 9.4 — Avec des fonctions composées — bis.**Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \sin\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$  .....

b)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \cos\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right)$  .....

c)  $x \in ]0, \pi[$  et  $f(x) = \sqrt{\sin(x)}$  .....

d)  $x \in ]0, +\infty[$  et  $f(x) = \sin(\sqrt{x})$  .....

**Calcul 9.5 — Avec des quotients.**Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2 \sin(x) + 3}$  .....

b)  $x \in ]0, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{3x + 2}$  .....

c)  $x \in \mathbb{R}$  et  $f(x) = \frac{\cos(2x + 1)}{x^2 + 1}$  .....

d)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x}{\ln(x)}$  .....

## Opérations et fonctions composées

**Calcul 9.6**Déterminer l'expression de  $f'(x)$  pour  $f$  définie par :

a)  $x \in \mathbb{R}^*$  et  $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  .....

b)  $x \in ]-3, 3[$  et  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$  .....

c)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)$  .....

d)  $x \in ]0, \pi[$  et  $f(x) = \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$  .....

## Dériver pour étudier une fonction

### Calcul 9.7



Calculer  $f'(x)$  et écrire le résultat sous forme factorisée.

a)  $x \in \mathbb{R} \setminus \{3, -2\}$  et  $f(x) = \frac{1}{3-x} + \frac{1}{2+x}$ . ....

b)  $x \in ]-1, +\infty[$  et  $f(x) = x^2 - \ln(x+1)$  ....

c)  $x \in ]1, +\infty[$  et  $f(x) = \ln(x^2 + x - 2) - \frac{x+2}{x-1}$ . ....

d)  $x \in ]-1, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{x}{x+1} + x - 2 \ln(x+1)$ . ....

e)  $x \in ]0, e[ \cup ]e, +\infty[$  et  $f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{1 - \ln(x)}$ . ....

### Réponses mélangées

$$\begin{aligned}
 & \frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2} & \frac{1}{x \ln(x)} & \frac{2}{x(1 - \ln(x))^2} & \frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x+2)^2} \\
 & (6x-1) \ln(x-2) + \frac{3x^2 - x}{x-2} & \frac{9}{(9-x^2)\sqrt{9-x^2}} & \frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2+4)^2} \sin\left(\frac{2x+1}{x^2+4}\right) & \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}} \\
 & \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)} & -3(3 \cos(x) - \sin(x))^2(3 \sin(x) + \cos(x)) & 5x^4 - 6x^2 + 4x - 15 \\
 & 6 \cos(2x) \exp(3 \sin(2x)) & \frac{(2x+3)(2 \sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2 \cos(x)}{(2 \sin(x) + 3)^2} & 5(x^2 - 5x)^4(2x - 5) \\
 & -2 \frac{(x^2 + 1) \sin(2x + 1) + x \cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2} & \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} & \frac{6x}{(x^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) & \frac{x^2}{(x + 1)^2} \\
 & \frac{(4x + 3) \ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2} & \frac{2}{x + 1} \left(x + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right) & \frac{10x - 5}{(3 - x)^2(2 + x)^2} \\
 & 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & 6x^2 + 2x - 11 & (2x^2 - 2x + 10) \exp(2x) & 8 \cos^2(x) - 6 \cos(x) \sin(x) - 4 \\
 & 4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2) & \frac{2x}{x^2 + 1} & (-2x^2 + 3x + 1) \exp(x^2 + x) & \frac{1}{1 - x^2}
 \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 58

## Primitives

### Prérequis

Intégration de Terminale. Dérivée d'une fonction composée.  
Trigonométrie directe et réciproque. Trigonométrie hyperbolique.

Pour chaque fonction à intégrer on pourra commencer par chercher les domaines où elle admet des primitives.

## Calculs directs

### Calcul 10.1



Déterminer directement une primitive des expressions suivantes.

a)  $\frac{1}{t+1}$  .....

c)  $\frac{3}{(t+2)^3}$  .....

b)  $\frac{3}{(t+2)^2}$  .....

d)  $\sin(4t)$  .....

### Calcul 10.2



Même exercice.

a)  $\sqrt{1+t} - \sqrt[3]{t}$  .....

c)  $\frac{1}{\sqrt{1-4t^2}}$  .....

b)  $e^{2t+1}$  .....

d)  $\frac{1}{1+9t^2}$  .....

## Utilisation des formulaires

### Calcul 10.3 — Dérivée d'une fonction composée.



Déterminer une primitive des expressions suivantes en reconnaissant la dérivée d'une fonction composée.

a)  $\frac{2t^2}{1+t^3}$  .....

d)  $\frac{7t}{\sqrt[3]{1+7t^2}}$  .....

b)  $t\sqrt{1+2t^2}$  .....

e)  $\frac{t}{1+3t^2}$  .....

c)  $\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$  .....

f)  $\frac{12t}{(1+3t^2)^3}$  .....

### Calcul 10.4 — Dérivée d'une fonction composée – bis.



Même exercice.

a)  $\frac{\ln^3 t}{t}$  .....

d)  $\frac{1}{t^2\sqrt{t}}$  .....

b)  $\frac{1}{t\sqrt{\ln t}}$  .....

e)  $\frac{e^t + e^{-t}}{1 - e^{-t} + e^t}$  .....

c)  $\frac{8e^{2t}}{(3 - e^{2t})^3}$  .....

f)  $\frac{e^{\frac{1}{t}}}{t^2}$  .....

## Calcul 10.5 — Trigonométrie.



Déterminer une primitive des expressions suivantes en reconnaissant la dérivée d'une fonction composée.

a)  $\cos^2 t \sin t \dots \dots \dots$

g)  $\tan^2 t \dots \dots \dots$

l)  $\frac{\cos t}{(1 - \sin t)^3} \dots \dots \dots$

b)  $\cos(t)e^{\sin t} \dots \dots \dots$

h)  $\tan^3 t \dots \dots \dots$

m)  $\frac{1}{1 + 4t^2} \dots \dots \dots$

c)  $\tan t \dots \dots \dots$

i)  $\frac{\tan^3 t}{\cos^2 t} \dots \dots \dots$

n)  $\frac{e^t}{1 + e^{2t}} \dots \dots \dots$

d)  $\frac{\cos t}{1 - \sin t} \dots \dots \dots$

j)  $\frac{1}{\cos^2(t)\sqrt{\tan t}} \dots \dots \dots$

o)  $\frac{\text{Arcsin}(t)}{\sqrt{1 - t^2}} \dots \dots \dots$

e)  $\frac{\sin \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \dots \dots \dots$

k)  $\frac{1 + \tan^2 t}{\tan^2 t} \dots \dots \dots$

p)  $\frac{1}{\sqrt{1 - t^2} \text{Arcsin}(t)} \dots \dots \dots$

f)  $\frac{\cos(\pi \ln t)}{t} \dots \dots \dots$

## Calcul 10.6 — Trigonométrie – bis.



Déterminer une primitive des expressions suivantes en utilisant d'abord le formulaire de trigonométrie.

a)  $\cos^2 t \dots \dots \dots$

d)  $\frac{\sin(2t)}{1 + \sin^2 t} \dots \dots \dots$

f)  $\frac{1}{\sin^2(t) \cos^2(t)} \dots \dots \dots$

b)  $\cos(t) \sin(3t) \dots \dots \dots$

e)  $\frac{1}{\sin t \cos t} \dots \dots \dots$

g)  $\frac{1}{\sin(4t)} \dots \dots \dots$

c)  $\sin^3 t \dots \dots \dots$

## Calcul 10.7 — Fractions rationnelles.



Déterminer une primitive des expressions suivantes après quelques manipulations algébriques simples.

a)  $\frac{t^2 + t + 1}{t^2} \dots \dots \dots$

d)  $\frac{t^3 + 1}{t + 1} \dots \dots \dots$

g)  $\frac{t - 1}{t^2 + 1} \dots \dots \dots$

b)  $\frac{t^2 + 1}{t^3} \dots \dots \dots$

e)  $\frac{t - 1}{t + 1} \dots \dots \dots$

h)  $\frac{t}{(t + 1)^2} \dots \dots \dots$

c)  $\frac{1 - t^6}{1 - t^2} \dots \dots \dots$

f)  $\frac{t^3}{t + 1} \dots \dots \dots$

## Dériver puis intégrer, intégrer puis dériver

### Calcul 10.8



Pour chacune des expressions suivantes :

- dériver puis factoriser l'expression ;
- intégrer l'expression.

a)  $t^2 - 2t + 5 \dots \dots \dots$

e)  $e^{2t} + e^{-3t} \dots \dots \dots$

b)  $\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} \dots \dots \dots$

f)  $e^{3t-2} \dots \dots \dots$

c)  $\sqrt{t} - \frac{1}{t^3} \dots \dots \dots$

g)  $\frac{t^2}{t^3 - 1} \dots \dots \dots$

d)  $\frac{1}{t^4} + \frac{1}{t\sqrt{t}} \dots \dots \dots$

h)  $\frac{3t - 1}{t^2 + 1} \dots \dots \dots$

i)  $\sin(t) \cos^2(t)$  ...

j)  $\sinh(t) \cosh(t)$  ...

k)  $\frac{1}{t^2} \sin \frac{1}{t}$  ...

l)  $\frac{e^t}{2+e^t}$  ...

m)  $\frac{\sin t}{2+3 \cos t}$  ...

n)  $\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$  ...

o)  $\frac{\sin 2t}{1+\cos^2 t}$  ...

p)  $te^{-t^2}$  ...

q)  $\frac{1-\ln t}{t}$  ...

r)  $\frac{1}{t \ln t}$  ...

s)  $\frac{\sin(\ln t)}{t}$  ...

t)  $\frac{e^t}{1+e^{2t}}$  ...

### Calcul 10.9 — Bis repetita.



Reprendre l'exercice précédent en commençant par intégrer puis en dérivant et factorisant.

### Réponses mélangées

$t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$        $-\frac{4}{t^5} - \frac{3}{2} \frac{1}{t^{5/2}}$  puis  $-\frac{1}{3} \frac{1}{t^3} - \frac{2}{\sqrt{t}}$        $-\frac{3}{t+2}$        $\frac{1}{2} e^{2t+1}$        $2\sqrt{\tan t}$

$2 \frac{3 \cos^2 t - 1}{(1 + \cos^2 t)^2}$  puis  $-\ln(1 + \cos^2 t)$        $\frac{1}{4} \ln^4 t$        $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$        $\frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{3}{t^4}$  puis  $\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2t^2}$

$-\text{cotant} + \tan t$        $-\frac{1}{t^2} \left( \frac{2}{t} + 1 \right)$  puis  $-\frac{1}{t} + \ln |t|$        $-\frac{e^t(e^{2t}-1)}{(1+e^{2t})^2}$  puis  $\text{Arctan}(e^t)$

$-\ln |1 - \sin t|$        $t + \ln |t| - \frac{1}{t}$        $t - 2 \ln |t+1|$        $2e^{2t} - 3e^{-3t}$  puis  $\frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{3} e^{-3t}$

$\frac{1}{6} (1+2t^2)^{\frac{3}{2}}$        $\ln |t+1| + \frac{1}{t+1}$        $\ln |t+1|$        $-\frac{1+\ln t}{t^2 \ln^2 t}$  puis  $\ln |\ln t|$        $-\frac{2}{3t^{\frac{3}{2}}}$        $-\frac{\cos(4t)}{4}$

$-\frac{2t \sin \frac{1}{t} + \cos \frac{1}{t}}{t^4}$  puis  $\cos \frac{1}{t}$        $\ln |t| - \frac{1}{2t^2}$        $\frac{1}{2} \frac{1}{(1-\sin t)^2}$        $\frac{2 \cos t + 3}{(2+3 \cos t)^2}$  puis  $-\frac{1}{3} \ln |2+3 \cos t|$

$\frac{3}{4} (1+7t^2)^{\frac{2}{3}}$        $-\cos t + \frac{1}{3} \cos^3 t$        $\cos t (3 \cos^2 t - 2)$  puis  $-\frac{1}{3} \cos^3 t$        $\frac{\ln t - 2}{t^2}$  puis  $\ln t - \frac{1}{2} \ln^2 t$

$\frac{1}{3} \text{Arctan}(3t)$        $\frac{2e^t}{(2+e^t)^2}$  puis  $\ln(2+e^t)$        $-\frac{3t^2 - 2t - 3}{(t^2+1)^2}$  puis  $\frac{3}{2} \ln(t^2+1) - \text{Arctan}(t)$

$2(t-1)$  puis  $\frac{1}{3} t^3 - t^2 + 5t$        $-2 \cos \sqrt{t}$        $-\sqrt{1-t^2}$        $\frac{2}{3} \ln |1+t^3|$        $\frac{1}{2} \ln(1+t^2) - \text{Arctan}(t)$

$\frac{1}{(1-t^2)^{3/2}}$  puis  $-\sqrt{1-t^2}$        $\frac{\cos \ln t - \sin \ln t}{t^2}$  puis  $-\cos(\ln t)$        $(1-2t^2)e^{-t^2}$  puis  $-\frac{1}{2} e^{-t^2}$

$\frac{1}{6} \ln(1+3t^2)$        $\frac{1}{4} \ln |\tan 2t|$        $\frac{2}{(3-e^{2t})^2}$        $\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$        $-\ln |\cos t|$        $\ln |\tan t|$

$\frac{2}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{4} t^{\frac{4}{3}}$        $\frac{1}{\pi} \sin(\pi \ln t)$        $\sinh(t)^2 + \cosh^2(t)$  puis  $\frac{1}{2} \sinh^2(t)$        $\ln(1+\sin^2 t)$

$\ln |\text{Arcsin}(t)|$        $-\frac{1}{(1+3t^2)^2}$        $\frac{1}{4} \tan^4 t$        $\ln |1-e^{-t}+e^t|$        $-\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4}$

$e^{\sin t}$        $\frac{1}{2} \tan^2 t + \ln |\cos t|$        $2\sqrt{\ln t}$        $3e^{3t-2}$  puis  $\frac{1}{3} e^{3t-2}$        $-\frac{1}{\tan t}$        $\frac{1}{2} (\text{Arcsin}(t))^2$

$\tan t - t$        $-e^{\frac{1}{t}}$        $\frac{1}{2} \text{Arcsin}(2t)$        $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln |t+1|$        $\text{Arctan}(e^t)$

$-\frac{1}{3} \cos^3 t$        $-\frac{t(t^3+2)}{(t-1)^2(t^2+t+1)^2}$  puis  $\frac{1}{3} \ln(|t^3-1|)$        $-\frac{3}{2(t+2)^2}$        $\frac{1}{2} \text{Arctan}(2t)$

► Réponses et corrigés page 61

## Calcul d'intégrales

### Prérequis

Primitives usuelles, composées simples.

## Intégrales et aires algébriques

On rappelle que  $\int_a^b f(x) dx$  est l'aire algébrique entre la courbe représentative de  $f$  et l'axe des abscisses du repère lorsque les bornes sont « dans le bon ordre ».

### Calcul 11.1



Sans chercher à calculer les intégrales suivantes, donner leur signe.

a)  $\int_{-2}^3 x^2 + e^x dx$  .

b)  $\int_5^{-3} |\sin 7x| dx$

c)  $\int_0^{-1} \sin x dx$  ...

### Calcul 11.2



En se ramenant à des aires, calculer de tête les intégrales suivantes.

a)  $\int_1^3 7 dx$  .....

c)  $\int_0^7 3x dx$  .....

e)  $\int_{-2}^2 \sin x dx$  .....

b)  $\int_7^{-3} -5 dx$  .....

d)  $\int_2^8 1 - 2x dx$  ...

f)  $\int_{-2}^1 |x| dx$  .....

## Calcul d'intégrales

On rappelle que si  $F$  est une primitive de  $f$  alors  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ , que l'on note  $\left[ F(x) \right]_a^b$ .

### Calcul 11.3 — Polynômes.



Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_{-1}^3 2 dx$  .....

d)  $\int_{-1}^1 3x^5 - 5x^3 dx$  .....

b)  $\int_1^3 2x - 5 dx$  .....

e)  $\int_0^1 x^5 - x^4 dx$  .....

c)  $\int_{-2}^0 x^2 + x + 1 dx$  .....

f)  $\int_1^{-1} x^{100} dx$  .....

### Calcul 11.4 — Fonctions usuelles.



Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sin x dx$  ...

c)  $\int_1^2 \frac{dx}{x^2}$  .....

e)  $\int_{-3}^2 e^x dx$  .....

b)  $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x dx$  ...

d)  $\int_1^{100} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  ...

f)  $\int_{-3}^{-1} \frac{dx}{x}$  .....

**Calcul 11.5 — De la forme  $f(ax + b)$ .**

Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_{-1}^2 (2x + 1)^3 dx$  .....

d)  $\int_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} \sin(3x) dx$  .....

b)  $\int_{-2}^4 e^{\frac{1}{2}x+1} dx$  .....

e)  $\int_0^{33} \frac{1}{\sqrt{3x+1}} dx$  .....

c)  $\int_0^1 \frac{dx}{\pi x + 2}$  .....

f)  $\int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) dx$  .....

**Calcul 11.6 — Fonctions composées.**

Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_1^3 \frac{x-2}{x^2-4x+5} dx$  .....

d)  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x (\cos x)^5 dx$  .....

b)  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x \sin(x^2 + 1) dx$  .....

e)  $\int_0^1 x e^{x^2-1} dx$  .....

c)  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan x dx$  .....

f)  $\int_0^1 \frac{x}{(x^2 + 1)^4} dx$  .....

**Calcul 11.7 — Divers.**

Calculer les intégrales suivantes.

a)  $\int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 2e^x + 1} dx$  .....

d)  $\int_1^e \frac{3x - 2 \ln x}{x} dx$  .....

b)  $\int_{-2}^3 |x + 1| dx$  .....

e)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) \sin(x) dx$  .....

c)  $\int_{-1}^2 \max(1, e^x) dx$  .....

f)  $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\cos x \sin x| dx$  .....

**Calcul 11.8 — Avec les nouvelles fonctions de référence.**

a)  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \arcsin x dx$  .....

d)  $\int_0^1 \operatorname{ch}(x) dx$  .....

b)  $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$  .....

e)  $\int_0^1 \sqrt{x} dx$  .....

c)  $\int_0^2 10^x dx$  .....

f)  $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{2}{1+9x^2} dx$  .....

**Réponses mélangées**

$\frac{99}{\ln 10}$	$\frac{7}{48}$	Positif	$-\frac{1}{30}$	$\frac{5}{2}$	50	$-\ln 3$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$
-2	$-\frac{2}{101}$	0	$\frac{e - \frac{1}{e}}{2}$	14	0	0	$\frac{8}{3}$	0
$3e - 4$	8	Positif	-54	$\frac{1}{2} - \frac{1}{e+1}$		$-\frac{1}{384}$	$e^2 - e^{-3}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{3}$	$\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$	$2(e^3 - 1)$	78	Négatif	$\frac{\sqrt{2}}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	
$\frac{17}{2}$	$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$\frac{147}{2}$	$\frac{2\pi}{9}$	$\frac{1}{\pi} \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$	0	$e^2$	6

► Réponses et corrigés page 64



## Intégrations par parties successives

Pour ces calculs de primitives et d'intégrales, on pourra réaliser plusieurs intégrations par parties successives.

### Calcul 12.3 — Calcul d'intégrales.



a)  $\int_0^1 (t^2 + 3t - 4)e^{2t} dt \dots \dots \dots \boxed{\phantom{000}}$

b)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t dt \dots \dots \dots \boxed{\phantom{000}}$

### Calcul 12.4 — Calcul de primitives.



Calculer des primitives des fonctions suivantes.

a)  $x \mapsto \sin(x)\operatorname{sh}(x) \dots \boxed{\phantom{000}}$

c)  $x \mapsto (x \ln x)^2 \dots \dots \boxed{\phantom{000}}$

b)  $x \mapsto \ln^2 x \dots \dots \boxed{\phantom{000}}$

d)  $x \mapsto e^{\arccos(x)} \dots \dots \boxed{\phantom{000}}$

### Réponses mélangées

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \quad -\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3} \quad \frac{5}{2}\operatorname{ch}(2) - \frac{1}{2}\operatorname{sh}(2) - \frac{3}{2} \quad \begin{cases} ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}e^{\arccos(x)}(x - \sqrt{1 - x^2}) \end{cases}$$

$$\frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2} \quad \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -\frac{1 + \ln x}{x} \end{cases} \quad \frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9} \quad \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1 + x^2) \end{cases}$$

$$\frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2 \ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2} \quad \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}(-\cos(x)\operatorname{sh}(x) + \sin(x)\operatorname{ch}(x)) \end{cases}$$

$$1 \quad \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi^2}{32} \quad \frac{5}{2} - e^2 \quad \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \operatorname{sh}(x) - \operatorname{ch}(x) \end{cases} \quad 2 \ln 2 - \frac{3}{4} \quad \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (-x + 2)e^x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^3 \left( \frac{1}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} \ln x + \frac{2}{27} \right) \end{cases} \quad \frac{\pi}{2} - 1 \quad \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2} \quad \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \quad 4$$

► Réponses et corrigés page 68

## Nombres complexes

### Prérequis

Forme algébrique et forme exponentielle.

## Pour s'échauffer

### Calcul 13.1 — Écriture algébrique.



Mettre les nombres complexes suivants sous forme algébrique.

a)  $(2 + 6i)(5 + i)$  .....

e)  $(2 - 3i)^4$  .....

b)  $(3 - i)(4 + i)$  .....

f)  $\frac{1}{3 - i}$  .....

c)  $(4 - 3i)^2$  .....

g)  $\frac{2 - 3i}{5 + 2i}$  .....

d)  $(1 - 2i)(1 + 2i)$  .....

h)  $e^{-i\frac{\pi}{3}}$  .....

### Calcul 13.2 — Forme exponentielle.



Mettre les nombres complexes suivants sous forme exponentielle.

a)  $12$  .....

e)  $-2e^{i\frac{3\pi}{5}}$  .....

b)  $-8$  .....

f)  $5 - 5i$  .....

c)  $\sqrt{3}i$  .....

g)  $-5 + 5i\sqrt{3}$  .....

d)  $-2i$  .....

h)  $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}$  .....

## Un calcul plus dur

### Calcul 13.3 — Une simplification.



On pose  $z = \frac{1 + \sqrt{2} + i}{1 + \sqrt{2} - i}$ .

a) Calculer  $|z|$  .....

b) Mettre  $z$  sous forme algébrique .....

c) Calculer  $z^{2021}$  .....

**Réponses mélangées**

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & 5 & 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)e^{i\frac{\pi}{4}} & \frac{4}{29} - \frac{19}{29}i & 8e^{i\pi} & 10e^{i\frac{2\pi}{3}} & 12 \\ \frac{3}{10} + \frac{1}{10}i & 2e^{-i\frac{\pi}{2}} & 13 - i & \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}} & 1 & 5\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} & 2e^{i\frac{8\pi}{5}} \\ 4 + 32i & -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} & & -119 + 120i & & 7 - 24i \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 71

## Trigonométrie et nombres complexes

### Prérequis

Nombres complexes, trigonométrie.

Dans toute cette fiche,  $x$  désigne une quantité réelle.

## Linéarisations

### Calcul 14.1



Linéariser :

a)  $\cos^3(x) \dots$

d)  $\cos(3x) \sin^3(2x) \dots$

b)  $\cos(2x) \sin^2(x) \dots$

e)  $\cos^3(2x) \cos(3x) \dots$

c)  $\cos^2(2x) \sin^2(x) \dots$

f)  $\sin^2(4x) \sin(3x) \dots$

## Arc-moitié, arc-moyen

### Calcul 14.2



Écrire sous forme trigonométrique (c'est-à-dire sous la forme  $r e^{i\theta}$ , avec  $r > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ ) :

a)  $1 + e^{i\frac{\pi}{6}} \dots$

e)  $-1 - e^{i\frac{\pi}{6}} \dots$

b)  $1 + e^{i\frac{7\pi}{6}} \dots$

f)  $1 - e^{i\frac{\pi}{12}} \dots$

c)  $e^{-i\frac{\pi}{6}} - 1 \dots$

g)  $\frac{1 + e^{i\frac{\pi}{6}}}{1 - e^{i\frac{\pi}{12}}} \dots$

d)  $1 + ie^{i\frac{\pi}{3}} \dots$

h)  $(1 + e^{i\frac{\pi}{6}})^{27} \dots$

### Calcul 14.3



Écrire sous forme trigonométrique (c'est-à-dire sous la forme  $r e^{i\theta}$ , avec  $r > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ ) :

a)  $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{2}} \dots$

b)  $e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{2}} \dots$

## Délinéarisations

### Calcul 14.4



Exprimer en fonction des puissances de  $\cos(x)$  et de  $\sin(x)$  :

a)  $\cos(3x) \dots$

b)  $\sin(4x) \dots$

## Factorisations

### Calcul 14.5



Factoriser :

a)  $\cos(x) + \cos(3x)$  .....

c)  $\cos(x) - \cos(3x)$  .....

b)  $\sin(5x) - \sin(3x)$  .....

d)  $\sin(3x) + \sin(5x)$  .....

### Calcul 14.6



Factoriser :

a)  $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x)$  .....

b)  $\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) + \cos(7x)$  .....

c)  $\cos(x) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$  .....

## Calculs d'intégrales

### Calcul 14.7



Calculer :

a)  $\int_0^\pi e^x \sin(x) dx$  .....

b)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos(x) dx$  .....

## Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccc}
 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)} e^{\frac{13i\pi}{24}} & 2 \sin(x) \sin(2x) & \frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right) \sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} & 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{13\pi}{12}} & 2 \cos(4x) \sin(x) \\
 \frac{1}{5}(e^\pi - 2) & -\frac{\sin(9x)}{8} + \frac{3 \sin(5x)}{8} - \frac{\sin(3x)}{8} - \frac{3 \sin(x)}{8} & -\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4} & & \\
 \left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right) e^{-i\frac{5\pi}{12}} & \frac{e^\pi + 1}{2} & 2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) e^{\frac{5i\pi}{12}} & 2 \sin(4x) \cos(x) & \\
 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{5\pi}{12}} & 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{11\pi}{12}} & 0 & \frac{\cos(9x)}{8} + \frac{3 \cos(5x)}{8} + \frac{\cos(3x)}{8} + \frac{3 \cos(x)}{8} & \\
 -\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4} & 2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{-i\frac{11\pi}{24}} & & \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x) & \\
 -\frac{1}{4} \sin(11x) + \frac{1}{4} \sin(5x) + \frac{1}{2} \sin(3x) & 2 \cos(2x) \cos(x) & 4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x) & & \\
 2^{27} \cos^{27}\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{4}} & 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12}} & 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x) & \frac{\sin(8x)}{2 \sin(x)} & 
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 73

# Réponses et corrigés



# Fiche n° 1. Fractions

## Réponses

1.1 a)  $\frac{4}{5}$  @par 1.1 b)  $\frac{2^5}{5}$  @par  
 1.1 c) .....  $\frac{3}{5}$  @par 1.1 d) .....  
 $-2 \times 3^{3k-2}$  @par 1.2 a) .....  
 $\frac{1}{6}$  @par 1.2 b)  $\frac{7}{15}$  @par 1.2 c)  
 $\frac{9}{9}$  @par 1.2 d)  $\frac{1}{9}$  @par 1.3 a)  
 $\frac{247}{247}$  @par 1.3 b) .....  $\frac{203}{24}$  @par  
 1.3 c) ...  $\frac{-10}{3}$  @par 1.3 d) ...

1 000 @par 1.4 .  $\frac{16}{35}$  @par 1.5  
 a).  $\frac{2022}{2}$  @par 1.5 b).  $\frac{1}{2}$  @par  
 1.5 c).  $\frac{1}{2}$  @par 1.5 d).  $\frac{1}{2}$  @par  
 1.6 a).  $\frac{-1}{n(n+1)^2}$  @par 1.6 b).  
 $\frac{-ab}{a-b}$  @par 1.6 c).  $\frac{3}{2}n$  @par  
 1.7 ...  $\frac{n^3+n}{n+1}$  @par 1.8 a) ...

$4 + \frac{5}{6}$  @par 1.8 b) .....  
 $1 + \frac{1}{k-1}$  @par 1.8 c) .....  
 $3 + \frac{5}{x-2}$  @par 1.9 ...  $2t$  @par  
 1.10 a).  $\frac{3}{5} > \frac{5}{9}$  @par 1.10 b).  
 $\frac{12}{11} > \frac{10}{12}$  @par 1.10 c) .....  
 $\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$  @par 1.11 .....  
 Non @par 1.12 .  $A > B$  @par

## Corrigés

1.1 a)  $\frac{32}{40} = \frac{8 \times 4}{8 \times 5} = \frac{4}{5}$

1.1 b)  $8^3 \times \frac{1}{4^2} = (2 \times 4)^3 \times \frac{1}{4^2} = 2^3 \times 4^3 \times \frac{1}{4^2} = 2^3 \times 4 = 2^5$

1.1 c)  $\frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4} = \frac{(3^3)^{-1} \times (2^2)^2}{3^{-4} \times 2^4} = \frac{3^4}{3^3} = 3$

1.1 d) On a :  $\frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}} = \frac{(-2) \times (-2)^{2k} \times 3^{2k} \times 3^{-1}}{4^k \times 3^{-k} \times 3} = \frac{(-2) \times 4^k \times 3^{2k} \times 3^k}{4^k \times 3^2} = -2 \times 3^{3k-2}.$

1.2 a) On met au même dénominateur :  $\frac{2}{4} - \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{6}{12} - \frac{4}{12} = \frac{6-4}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$

1.2 b) On transforme 0,2 en fraction et on met au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} - 0,2 &= \frac{2}{3} - \frac{2}{10} = \frac{2 \times 10}{3 \times 10} - \frac{2 \times 3}{10 \times 3} \\ &= 20 \frac{20-6}{30-30} = \frac{20-6}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7 \times 2}{15 \times 2} = \frac{7}{15}. \end{aligned}$$

1.2 c) Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5 = \frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times \frac{5}{1} = \frac{36 \times 15 \times 5}{25 \times 12 \times 1} = \frac{12 \times 3 \times 5 \times 3 \times 5}{5 \times 5 \times 12 \times 1} = \frac{3 \times 3}{1} = \frac{9}{1} = 9.$$

1.2 d) Pour diviser une fraction par une autre, on la multiplie par la fraction inverse de la deuxième fraction :

$$-\frac{2}{15} \div \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{2}{15} \times \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{2}{15} \times \frac{5}{6} = \frac{2 \times 5}{15 \times 6} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5 \times 2 \times 3} = \frac{1}{9}.$$

1.3 a) On développe :

$$\begin{aligned} (2 \times 3 \times 5 \times 7) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7}\right) &= \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{2} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{3} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{5} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{7} \\ &= 3 \times 5 \times 7 + 2 \times 5 \times 7 + 2 \times 3 \times 7 + 2 \times 3 \times 5 = 105 + 70 + 42 + 30 = 247. \end{aligned}$$

**1.3 b)** On simplifie d'abord, puis on applique les règles de calcul :

$$\begin{aligned}\left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10}\right) \times \frac{21}{24} &= \left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{31}{5}\right) \times \frac{7}{8} \\ &= \left(\frac{136}{15} + \frac{3}{5}\right) \times \frac{7}{8} = \left(\frac{136}{15} + \frac{9}{15}\right) \times \frac{7}{8} = \frac{145}{15} \times \frac{7}{8} = \frac{29}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{203}{24}.\end{aligned}$$

**1.3 c)** On simplifie d'abord les termes comportant des exposants :

$$\frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3} = \frac{5^{10} \times 7^3 - 5^{10} \times 7^4}{5^9 \times 7^3 + 5^9 \times 7^3 \times 2^3} = \frac{5^{10} \times 7^3(1 - 7)}{5^9 \times 7^3(1 + 2^3)} = \frac{5 \times (-6)}{9} = \frac{-10}{3}.$$

**1.3 d)** On calcule :

$$\begin{aligned}\frac{1\ 978 \times 1\ 979 + 1\ 980 \times 21 + 1\ 958}{1\ 980 \times 1\ 979 - 1\ 978 \times 1\ 979} &= \frac{1\ 978 \times 1\ 979 + 1\ 979 \times 21 + 21 + 1\ 958}{1\ 979 \times (1\ 980 - 1\ 978)} \\ &= \frac{1\ 979 \times (1\ 978 + 21) + 1\ 979}{1\ 979 \times 2} = \frac{1\ 979 \times (1\ 978 + 21 + 1)}{1\ 979 \times 2} = \frac{1\ 979 \times 2\ 000}{1\ 979 \times 2} \\ &= 1\ 000.\end{aligned}$$

**1.4** On calcule :

$$\begin{aligned}\frac{0,5 - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{0,5 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - 0,2}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - 3,5} &= \frac{\frac{3}{6} - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - \frac{7}{2}} \\ &= \frac{3\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{17} + \frac{1}{37}\right)}{5\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{17} + \frac{1}{37}\right)} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{-7\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7} = \frac{16}{35}.\end{aligned}$$

**1.5 a)** On connaît l'identité remarquable :  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ .

$$\text{Donc : } \frac{2\ 022}{(-2\ 022)^2 + (-2\ 021)(2\ 023)} = \frac{2\ 022}{(2\ 022)^2 + (1 - 2\ 022) \times (1 + 2\ 022)} = \frac{2\ 022}{(2\ 022)^2 + 1 - 2\ 022^2} = 2\ 022.$$

**1.5 b)** On fait apparaître 2 021 dans 2 020 et 2 022 au dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{2\ 021^2}{2\ 020^2 + 2\ 022^2 - 2} &= \frac{2\ 021^2}{(2\ 021 - 1)^2 + (2\ 021 + 1)^2 - 2} \\ &= \frac{2\ 021^2}{2\ 021^2 - 2 \times 2\ 021 \times 1 + 1 + 2\ 021^2 + 2 \times 2\ 021 \times 1 + 1 - 2} \\ &= \frac{2\ 021^2}{2\ 021^2 - 2 \times 2\ 021 \times 1 + 2\ 021^2 + 2 \times 2\ 021 \times 1} = \frac{2\ 021}{2\ 021 - 2 + 2\ 021 + 2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

**1.5 c)** En posant  $a = 1\ 234$ , on a :  $1\ 235 = a + 1$  et  $2\ 469 = 2a + 1$ .

$$\text{Donc : } \frac{1\ 235 \times 2\ 469 - 1\ 234}{1\ 234 \times 2\ 469 + 1\ 235} = \frac{(a + 1)(2a + 1) - a}{a(2a + 1) + a + 1} = \frac{2a^2 + 2a + 1}{2a^2 + 2a + 1} = 1.$$

**1.5 d)** En posant  $a = 1\ 000$ , on a :  $999 = a - 1$ ,  $1\ 001 = a + 1$ ,  $1\ 002 = a + 2$  et  $4\ 002 = 2a + 2$ .

$$\text{Donc : } \frac{4\ 002}{1\ 000 \times 1\ 002 - 999 \times 1\ 001} = \frac{4a + 2}{a(a + 2) - (a - 1)(a + 1)} = \frac{2(2a + 1)}{a^2 + 2a - (a^2 - 1)} = \frac{2(2a + 1)}{2a + 1} = 2.$$

**1.6 a)** On met au même dénominateur. Cela donne :

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} &= \frac{n}{n(n+1)^2} + \frac{n(n+1)}{n(n+1)^2} - \frac{(n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{n+n(n+1)-(n+1)^2}{n(n+1)^2} \\ &= \frac{n+n^2+n-(n^2+2n+1)}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2}.\end{aligned}$$

**1.6 b)** On rappelle la formule :  $a^3 - b^3 = (a - b)(ab + a^2 + b^2)$ . Cela donne :

$$\frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} = \frac{(a-b)(ab + a^2 + b^2)}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} = \frac{ab + a^2 + b^2}{a-b} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a-b} = -\frac{ab}{a-b}.$$

**1.6 c)** Pour  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , on a :

$$\frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}} = \frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)} \times \frac{n^2(n-1)^2}{2n+2} = \frac{6(n+1)}{2(n-1)} \times \frac{n(n-1)}{2(n+1)} = \frac{3}{2}n.$$

**1.7** De  $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ , on a :  $\frac{\sum_{k=0}^{n^2} k}{\sum_{k=0}^n k} = \frac{\frac{n^2(n^2+1)}{2}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n^2(n^2+1)}{2} \frac{2}{n(n+1)} = \frac{n(n^2+1)}{n+1} = \frac{n^3+n}{n+1}$ .

**1.8 a)** On trouve  $\frac{29}{6} = \frac{4 \times 6 + 5}{6} = 4 + \frac{5}{6}$ .

**1.8 b)** On trouve  $\frac{k}{k-1} = \frac{k-1+1}{k-1} = 1 + \frac{1}{k-1}$ .

**1.8 c)** On trouve  $\frac{3x-1}{x-2} = \frac{3(x-2)+5}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}$ .

**1.9** Pour  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , on a :

$$\begin{aligned}A &= \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(1+t)^2} = \frac{(1+t)^2}{(1+t^2)(1+t)^2} - \frac{1+t^2}{(1+t^2)(1+t)^2} = \frac{1+2t+t^2-(1+t^2)}{(1+t^2)(1+t)^2} \\ &= 2t \frac{2t}{(1+t^2)(1+t)^2}. \text{ Donc, } AB = \left( \frac{2t}{(1+t^2)(1+t)^2} \right) \times (1+t^2)(1+t)^2 = 2t.\end{aligned}$$

**1.10 a)**  $\frac{3}{5} = \frac{27}{45} > \frac{5}{9} = \frac{25}{45}$

**1.10 c)**  $\frac{125}{25} = 5 = \frac{105}{21}$

**1.11** Nous allons étudier les produits en croix.

On sait que  $A = B$ , si et seulement si  $33\ 215 \times 208\ 341 = 66\ 317 \times 104\ 348$ . Le nombre de gauche est le produit de deux nombres impairs, il est impair. Par contre, le nombre de droite est le produit de deux nombres de parités différentes, il est pair. Par conséquent, l'égalité n'est pas vérifiée.  $A$  et  $B$  ne sont pas égaux.

**1.12** On ré-écrit  $A = \frac{10^5 + 1}{10^6 + 1}$  et  $B = \frac{10^6 + 1}{10^7 + 1}$ . Nous allons étudier les produits en croix.

D'une part calculons :  $(10^5 + 1) \times (10^7 + 1) = 10^{12} + 10^7 + 10^5 + 1$ .

D'autre part :  $(10^6 + 1)^2 = 10^{12} + 2 \times 10^6 + 1$ .

Comme  $(10^5 + 1) \times (10^7 + 1) > (10^6 + 1) \times (10^6 + 1)$ , on obtient :  $A > B$ .

## Fiche n° 2. Puissances

### Réponses

2.1 a) ...  $10^8$  @par 2.1  
 b) ...  $10^{15}$  @par 2.1 c).  
 $10^2$  @par 2.1 d) ....  
 $10^{-2}$  @par 2.1 e) ....  
 $10^4$  @par 2.1 f) ....  
 $10^{-8}$  @par 2.2 a) ....  
 $15^4$  @par 2.2 b) ....

$5^{-6}$  @par 2.2 c) ....  
 $2^7$  @par 2.2 d) ....  
 $(-7)^{-2}$  @par 2.2 e) ...  
 $3^5$  @par 2.2 f) ....  
 $3^{28}$  @par 2.3 a) ....  
 $2^{-4} \cdot 3^{-1}$  @par 2.3 b)

$2^{21} \cdot 3$  @par 2.3 c) ....  
 $2$  @par 2.3 d) ....  
 $2^{38} \cdot 3^{26}$  @par 2.4 a) ...  
 $8$  @par 2.4 b) ....  
 $11$  @par 2.4 c) ....  
 $3^{10}$  @par 2.4 d) ....  
 $2^6 \cdot 5$  @par 2.5 a) ....

$\frac{x}{x+1}$  @par 2.5 b) ...  
 $\frac{1}{x-2}$  @par 2.5 c) ....  
 $\frac{2x}{x+1}$  @par 2.5 d) ...  
 $\frac{2}{x-2}$  @par

### Corrigés

2.3 a)  $\frac{2^3 \cdot 3^2}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 6^{-1}} = \frac{2^3 \cdot 3^2}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 2^{-1} \cdot 3^{-1}} = \frac{2^3 \cdot 3^2}{3^{4-1} \cdot 2^{8-1}} = \frac{2^3 \cdot 3^2}{3^3 \cdot 2^7} = 2^{3-7} \cdot 3^{2-3} = 2^{-4} \cdot 3^{-1}.$

2.3 b) On factorise :  $2^{21} + 2^{22} = 2^{21} + 2^{21} \cdot 2 = 2^{21} \cdot (1 + 2) = 2^{21} \cdot 3.$

2.3 c) On factorise au numérateur et au dénominateur :  $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}} = \frac{(3+1) \cdot 3^{21}}{(3-1) \cdot 3^{21}} = \frac{4}{2} = 2.$

2.3 d) On simplifie en appliquant les règles habituelles de calcul avec les puissances, et en exploitant le fait que

$$(-a)^n = a^n \text{ lorsque } n \text{ est pair} : \frac{(3^2 \cdot (-2)^4)^8}{((-3)^5 \cdot 2^3)^{-2}} = \frac{3^{16} \cdot 2^{32}}{3^{-10} \cdot 2^{-6}} = 2^{38} \cdot 3^{26}.$$

2.4 a) On fait apparaître les facteurs premiers 2 et 3 :

$$\frac{8^{17} \cdot 6^{-6}}{9^{-3} \cdot 2^{42}} = \frac{2^{3 \cdot 17} \cdot 2^{-6} \cdot 3^{-6}}{3^{2 \cdot (-3)} \cdot 2^{42}} = \frac{2^{51-6} \cdot 3^{-6}}{3^{-6} \cdot 2^{42}} = 2^{45-42} = 2^3 = 8.$$

2.4 b) Avec les facteurs premiers 5 et 11 :  $\frac{55^2 \cdot 121^{-2} \cdot 125^2}{275 \cdot 605^{-2} \cdot 25^4} = \frac{(5 \cdot 11)^2 \cdot (11^2)^{-2} \cdot (5^3)^2}{5^2 \cdot 11 \cdot (11^2 \cdot 5)^{-2} \cdot (5^2)^4} = \frac{5^8 \cdot 11^{-2}}{5^8 \cdot 11^{-3}} = 11.$

2.4 c) On fait apparaître les facteurs premiers 2, 3 et 5 :  $\frac{12^{-2} \cdot 15^4}{25^2 \cdot 18^{-4}} = \frac{(2^2)^{-2} \cdot 3^{-2} \cdot 5^4}{(5^2)^2 \cdot 2^{-4} \cdot (3^2)^{-4}} = \frac{2^{-4} \cdot 3^2 \cdot 5^4}{2^{-4} \cdot 3^{-8} \cdot 5^4} = 3^{10}.$

2.4 d) Même méthode que précédemment :  $\frac{36^3 \cdot 70^5 \cdot 10^2}{14^3 \cdot 28^2 \cdot 15^6} = \frac{2^6 \cdot 3^6 \cdot 2^5 \cdot 5^5 \cdot 7^5 \cdot 2^2 \cdot 5^2}{2^3 \cdot 7^3 \cdot 2^4 \cdot 7^2 \cdot 3^6 \cdot 5^6} = \frac{2^{13} \cdot 3^6 \cdot 5^7 \cdot 7^5}{2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^6 \cdot 7^5} = 2^6 \cdot 5.$

2.5 a) On met au même dénominateur les deux premières écritures fractionnaires :

$$\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1} = \frac{x(x+1) - 2(x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2}{x^2-1} = \frac{x^2+x-2x+2}{(x+1)(x-1)} - \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2-x}{(x+1)(x-1)} = \frac{x}{x+1}$$

2.5 b) Même méthode :

$$\frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4} = \frac{2(x-2) - (x+2)}{(x+2)(x-2)} + \frac{8}{(x+2)(x-2)} = \frac{2x-4-x-2+8}{(x+2)(x-2)} = \frac{1}{x-2}$$

2.5 c) On commence par simplifier les puissances superflues, puis c'est le même principe que précédemment :

$$\frac{x^2}{x^2-x} + \frac{x^3}{x^3+x^2} - \frac{2x^2}{x^3-x} = \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1} - \frac{2x}{x^2-1} = \frac{x(x+1+x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x^2-2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{x+1}$$

2.5 d)

$$\frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x} = \frac{1}{x} + \frac{x+2}{(x+2)(x-2)} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{x-2+x}{x(x-2)} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{2}{x-2}$$



## Fiche n° 3. Calcul littéral

### Réponses

3.1 a)  $8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}$  @par 3.1 b)  $x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$  @par 3.1 c)  $x^5 - x^3 + x^2 - 1$  @par 3.1 d)  $x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$  @par 3.1 e)  $x^5 - x^3 - x^2 + 1$  @par 3.1 f)  $-2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4$  @par 3.2 b)  $-28 + 21x$  @par 3.2 c)  $2 + x^3 - x^4 - x^5$  @par 3.2 d)  $-1 - 3x - 3x^2 + x^3$  @par 3.2 e)  $1 + x^4$  @par 3.2 f)  $1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$  @par 3.3 a)  $-6(6x + 7)$  @par 3.3 b)  $4(5x + 4)(-5x + 1)$  @par 3.3 c)  $2(3x - 4)(10x + 3)$  @par 3.3 d)  $-8(x + 1)(x + 16)$  @par 3.4 a)  $(x - 1)^2$  @par 3.4 b)  $(x + 2)^2$  @par 3.4 c)  $(x + 1)(x + 2)$  @par 3.4 d)  $3\left(x + \frac{7 - \sqrt{37}}{6}\right)\left(x + \frac{7 + \sqrt{37}}{6}\right)$  @par 3.4 e).

3.4 f)  $2\left(x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4}\right)$  @par 3.4 g)  $-5(x - 1)\left(x - \frac{1}{5}\right)$  @par 3.5 a)  $(x + y - z)(x + y + z)$  @par 3.5 b)  $3(14x + 3y)(-4x + y)$  @par 3.5 c)  $(x + 1)(y + 1)$  @par 3.5 d)  $(x - 1)(y - 1)$  @par 3.5 e)  $(x + y)(x + 1)^2$  @par 3.5 f)  $(a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2)$  @par 3.6 a)  $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$  @par 3.6 b)  $-8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4)$  @par 3.6 c)  $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$  @par 3.6 d)  $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$  @par 3.6 e)  $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(p^2 + q^2 + r^2 + s^2)$  @par

### Corrigés

3.1 a) On utilise directement l'identité remarquable  $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ .

3.1 b) On peut écrire :  $(x - 1)^3(x^2 + x + 1) = (x^3 - 3x^2 + 3x - 1)(x^2 + x + 1) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$ .

Pour être “efficace”, il suffit de rechercher directement le coefficient du terme d'un degré donné (sachant que  $(ax^n)(bx^p) = abx^{n+p}$ ). Par exemple, dans l'expression finale et en utilisant l'étape intermédiaire, le coefficient du terme de degré 2 est donné par  $(-3) \times 1 + 3 \times 1 + (-1) \times 1 = -1$ . Ici, l'étape intermédiaire n'étant pas compliquée (à effectuer et à retenir), on peut (éventuellement) se passer de l'écrire.

3.1 c) Connaissant les identités remarquables  $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$  et  $(x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$ , on a facilement :

$$(x + 1)^2(x - 1)(x^2 - x + 1) = [(x + 1)(x - 1)][(x + 1)(x^2 - x + 1)] = (x^2 - 1)(x^3 + 1) = x^5 - x^3 + x^2 - 1.$$

Que pensez-vous de la nécessité d'écrire les étapes intermédiaires ?

3.1 d) On calcule :  $(x + 1)^2(x - 1)(x^2 + x + 1) = (x^2 + 2x + 1)(x^3 - 1) = x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$ .

3.1 e) On calcule :  $(x - 1)^2(x + 1)(x^2 + x + 1) = (x^2 - 1)(x^3 - 1) = x^5 - x^3 - x^2 + 1$ .

3.3 a) Une identité remarquable fait apparaître le facteur commun  $6x + 7$ . On calcule alors

$$-(6x + 7)(6x - 1) + 36x^2 - 49 = -(6x + 7)(6x - 1) + (6x)^2 - 7^2 = (6x + 7)[-(6x - 1) + 6x - 7] = -6(6x + 7)$$

3.3 b) On calcule  $25 - (10x + 3)^2 = 5^2 - (10x + 3)^2 = (10x + 8)(-10x + 2) = 4(5x + 4)(-5x + 1)$ .

**3.4 c)** La forme canonique est  $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$ . On en déduit la factorisation à l'aide de l'identité remarquable  $a^2 - b^2 = \dots$

**3.4 d)** La forme canonique est  $3\left[\left(x + \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{37}{36}\right]$ .

**3.4 e)** La forme canonique est  $2\left[\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{233}{16}\right]$ .

**3.4 f)** La forme canonique est  $-5\left[\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 - \frac{4}{25}\right]$ .

**3.5 b)** On calcule  $x^2 + 6xy + 9y^2 - 169x^2 = (x + 3y)^2 - (13x)^2 = (14x + 3y)(-12x + 3y) = 3(14x + 3y)(-4x + y)$ .

**3.5 e)** On calcule  $x^3 + x^2y + 2x^2 + 2xy + x + y = (x + y)(x^2 + 2x + 1) = (x + y)(x + 1)^2$ .

**3.6 a)** On calcule  $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$ .

**3.6 b)** On calcule  
 $(-9x^2 + 24)(8x^2 + 8) + 64x^4 - 64 = -8(x^2 + 1)[9x^2 - 24 - 8(x^2 - 1)] = -8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4)$ .

**3.6 c)** On calcule  $x^4 + x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = (x^2 + 1) - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ . La factorisation est alors terminée sur  $\mathbb{R}$  puisque les deux équations,  $x^2 + x + 1 = 0$  et  $x^2 - x + 1 = 0$ , n'ont pas de solutions réelles.

**3.6 d)** Une fois n'est pas coutume : on peut commencer par développer avant de factoriser. Ce qui donne

$$(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 = a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

Remarque : signalons tout de même qu'une autre voie (sans calcul) consiste à interpréter en termes de module d'un produit de deux nombres complexes !

## Fiche n° 4. Racines carrées

### Réponses

**4.1 a)** .....  $5$  @par **4.1 b)** .....

$\sqrt{3} - 1$  @par **4.1 c)** .....

$-\sqrt{3} + 2$  @par **4.1 d)** .....

$\sqrt{7} - 2$  @par **4.1 e)**  $[\pi - 3]$  @par

**4.1 f)** ...  $|3 - a|$  @par **4.2 a)**...

$20$  @par **4.2 b)** .  $9 + 4\sqrt{5}$  @par

**4.2 c)** ...  $1 + \sqrt{3}$  @par **4.2 d)** ..

$3 + \sqrt{2}$  @par **4.2 e)**  $12\sqrt{7}$  @par

**4.2 f)** .....  $12$  @par **4.2 g)** .....

$9 - \frac{10}{3}\sqrt{2}$  @par **4.2 h)**  $10$  @par

**4.3 a)**  $2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6}$  @par

**4.3 b)** ...  $3 - 2\sqrt{2}$  @par **4.3 c)** ..

$1 - \sqrt{10} + \sqrt{15}$  @par **4.3 d)** .....

$\sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2$  @par **4.3**

e) ...  $-(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  @par **4.3 f)** ..

$-\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}$  @par **4.3**

g) .....  $2\sqrt{2}$  @par **4.3 h)** .....

$50 - 25\sqrt{3}$  @par **4.4** .....

$\frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}$  @par **4.5 a)**.....

$\frac{x}{\sqrt{x-1}}$  @par **4.5 b)** .....

$x - \sqrt{x^2 - 1}$  @par **4.5 c)** .....

$1 + \sqrt{x-1}$  @par **4.5 d)** .....

$\frac{1}{2} \frac{1}{x-1}$  @par **4.5 e)** .....

$\frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}$  @par **4.5 f)** .....

$-4(x-1)^2$  @par **4.6 a)** .....

$\sqrt{2}$  @par **4.6 b)**  $2\sqrt{2}$  @par **4.7**

a) ...  $-11 + 5\sqrt{5}$  @par **4.7 b)** ..

$1 + \sqrt{2}$  @par **4.7 c)** .....

$1 + \sqrt{2}$  @par **4.7 d)** .  $\sqrt{3}$  @par

**4.7 e)** ...  $1 + \sqrt{5}$  @par **4.7 f)** ...

$\ln(1 + \sqrt{2})$  @par **4.8** .  $1$  @par

### Corrigés

**4.1 a)** Quand  $a$  est un réel positif,  $\sqrt{a}$  est le nombre positif dont le carré vaut  $a$  donc  $\sqrt{(-5^2)} = 5$ .

**4.1 f)** On trouve  $|3 - a|$ , c'est-à-dire  $3 - a$  si  $a \leq 3$  et  $a - 3$  si  $a \geq 3$ .

**4.2 c)** On essaie de reconnaître une identité remarquable dans la racine :

$$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{1 + 2\sqrt{3} + 3} = \sqrt{(1 + \sqrt{3})^2} = 1 + \sqrt{3}.$$

**4.3 a)** On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}} &= \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}} \times \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{3})(2 - \sqrt{2})}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} \\ &= \frac{(2 - \sqrt{3})(2 - \sqrt{2})}{2^2 - 2} = \frac{4 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2} \\ &= 2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6}. \end{aligned}$$

**4.4** On pose  $A := \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}$ . On a :

$$A = \frac{1}{1 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})} = \frac{1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(1 + (\sqrt{2} + \sqrt{3}))(1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3}))} = \frac{1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})}{1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - 1}{4 + 2\sqrt{6}}.$$

Ainsi, la technique de la « quantité conjuguée » n'est pas suffisante ici ; mais on peut la réappliquer. On a

$$A = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3} - 1)(4 - 2\sqrt{6})}{(4 + 2\sqrt{6})(4 - 2\sqrt{6})} = \frac{4\sqrt{2} - 4\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 6\sqrt{2} - 4 + 2\sqrt{6}}{16 - 24} = \frac{2\sqrt{2} + 4 - 2\sqrt{6}}{8} = \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}.$$

Ainsi, on a  $\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}$  : ce qu'on cherchait.

Remarque : on pouvait aussi faire un autre type de quantité conjuguée :

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}{(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})(1 + \sqrt{2} - \sqrt{3})} = \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}.$$

**4.5 c)** On essaie de reconnaître une identité remarquable dans la racine :

$$\sqrt{x + 2f(x)} = \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} = \sqrt{\sqrt{x-1}^2 + 2\sqrt{x-1} + 1} = \sqrt{(\sqrt{x-1} + 1)^2} = \sqrt{x-1} + 1.$$

**4.5 e)** Le calcul donne  $f''(x) = -\frac{1}{4} \frac{1}{(x-1)^{3/2}}$  d'où :

$$f(x) + 4f''(x) = \sqrt{x-1} - \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}} = \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}}((x-1)^2 - 1) = \frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}.$$

**4.6 a)** On calcule :

$$(\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}})^2 = 3 + \sqrt{5} - 2\sqrt{3 + \sqrt{5}}\sqrt{3 - \sqrt{5}} + 3 - \sqrt{5} = 6 - 2\sqrt{9 - 5} = 6 - 2\sqrt{4} = 6 - 4 = 2.$$

De plus,  $\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}} \geq 0$ , donc  $\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}} = \sqrt{2}$ .

**4.7 b)** On calcule  $3 + 2\sqrt{2} = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2} + 1^2 = (1 + \sqrt{2})^2$  et on trouve donc

$$\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}.$$

**4.7 e)** On calcule :  $2\sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}} = \sqrt{6 + 2\sqrt{5}} = \sqrt{1 + 2\sqrt{5} + \sqrt{5}^2} = \sqrt{(1 + \sqrt{5})^2} = 1 + \sqrt{5}$ .

**4.8** Appelons  $A$  ce nombre barbare, et écrivons-le  $A = \alpha - \beta$  en posant

$$\alpha = \sqrt[3]{3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}} \text{ et } \beta = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}}.$$

Plutôt que de se lancer dans des choses compliquées, calculons  $A^3$  à l'aide de l'identité remarquable. On a

$$A^3 = \alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3 = \alpha^3 - \beta^3 - 3\alpha\beta(\alpha - \beta)$$

ce qui donne

$$A^3 = 6 - 3A\sqrt[3]{\left(3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}\right)\left(-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}\right)}$$

d'où finalement  $A^3 = 6 - 5A$ , ce qui est équivalent à  $(A - 1)(A^2 + A + 6) = 0$  en observant que 1 est racine évidente de l'équation  $t^3 + 5t - 6 = 0$  d'inconnue  $t$ , puis finalement 1 est l'unique racine réelle de cette équation, et donc  $A = 1$ .

## Fiche n° 5. Expressions algébriques

### Réponses

5.1 a)  $7a^2 + 12a + 7$  @par 5.1  
 b)  $a^2 - 1$  @par 5.1 c) ....  
 $4a^2 - a - 3$  @par 5.1 d) ....  
 $-a^2 + 1$  @par 5.2 a) ....  
 $8 + 6i$  @par 5.2 b)  $8 - 6i$  @par  
 5.2 c)  $18 - 26i$  @par 5.2 d) ..  
 $-9 - 46i$  @par 5.3 a) ....  
 $39 - 18i$  @par 5.3 b) ....  
 $2197$  @par 5.3 c) ....

$-4 + 43i\sqrt{5}$  @par 5.3 d) ....  
 $1$  @par 5.4 a)  $3$  @par 5.4 b)  
 $1$  @par 5.4 c)  $1$  @par 5.4 d).  
 $0$  @par 5.4 e)  $-1$  @par 5.4 f)  
 $31$  @par 5.5 a) ...  $a^2 + 2$  @par  
 5.5 b) ...  $a^3 + 3a$  @par 5.5 c) ..  
 $a^4 + 4a^2 + 2$  @par 5.6 a) ....  
 $a^2 - 2b$  @par 5.6 b) ....

$ab - 3c$  @par 5.6 c) ....  
 $a^3 - 3ab + 3c$  @par 5.6 d) ....  
 $ab - c$  @par 5.6 e) ....  $ac$  @par  
 5.6 f)  $-2ac + b^2$  @par 5.7 a).  
 $a^2b - ac - 2b^2$  @par 5.7 b) ....  
 $a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2$  @par 5.7  
 c)  $0$  @par 5.7 d)  $1$  @par 5.7  
 e) ....  $a$  @par

### Corrigés

5.1 a) On développe  $(a + 2)^3 = a^3 + 6a^2 + 12a + 8$ , puis on simplifie sachant que  $a^3 = a^2 - 1$ .

5.1 b) De  $a^3 = a^2 - 1$ , on déduit  $a^6 = a^3(a^2 - 1) = a^5 - a^3$  et donc  $a^5 - a^6 = a^3$ . De plus  $a^3 = a^2 - 1$ .

5.1 c) On commence par  $a^6 = (a^3)^2 = (a^2 - 1)^2 = a^4 - 2a^2 + 1 = -a^2 - a$  puis  $a^{12} = (-a^2 - a)^2 = a^4 + 2a^3 + a^2$ .

5.1 d) L'égalité  $a^3 - a^2 + 1$  peut s'écrire  $a(a - a^2) = 1$  ce qui montre que  $a \neq 0$  et  $\frac{1}{a} = a - a^2$ . Alors  $\frac{1}{a^2} = 1 - a$ .

5.2 a) On développe :  $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2$ .

5.2 b) On développe :  $(3 - i)^2 = 9 + 6(-i) + (-i)^2 = 9 - 6i + i^2$ .

5.2 c) D'après le calcul précédent :  $(3 - i)^3 = (8 - 6i)(3 - i) = 24 - 18i - 8i + 6i^2$ .

5.2 d) On développe directement :  $(3 - 2i)^3 = 3^3 - 3 \cdot 3^2(2i)^1 + 3 \cdot 3^1(2i)^2 - (2i)^3$ .

5.3 a) On développe :  $24 - 30i + 12i - 15i^2$ .

5.3 b) En remarquant que  $(2 + 3i)(2 - 3i) = 2^2 - (3i)^2 = 4 + 9$ , on obtient par associativité  $13^3$ .

5.3 c) On développe :  $(-4 + i\sqrt{5})^3 = -4^3 + 3 \cdot 4^2(i\sqrt{5}) - 3 \cdot 4^1(i\sqrt{5})^2 + (i\sqrt{5})^3 = -64 + 48i\sqrt{5} + 60 - 5i\sqrt{5}$ .

5.3 d) On développe :  $(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})^3 = -\frac{1}{8} + 3 \cdot i\frac{\sqrt{3}}{8} + 3 \cdot \frac{3}{8} - i\frac{3\sqrt{3}}{8}$ .

5.4 a) De  $a^5 = 1$ , on déduit  $a^7 = a^2$  et  $a^6 = a$  donc tous les termes se simplifient sauf deux :  $4 - 1 = 3$ .

5.4 b) On commence par  $a^{1234} = (a^{10})^{123} \times a^4 = a^4$  car  $a^{10} = (a^5)^2 = 1$ . De même  $a^{2341} = a^1$ , etc. et on obtient donc finalement  $a^4 \times a^1 \times a^2 \times a^3 = a^{10} = 1$ .

5.4 c) Ceci vaut  $a^S$  où  $S = \sum_{k=0}^{1234} k = \frac{1234 \times (1234 + 1)}{2}$  est un entier multiple de 5.

5.4 d) Cette somme partielle de suite géométrique vaut  $\frac{a^5 - 1}{a - 1}$ .

5.4 e) Cette somme géométrique vaut  $\frac{a^{99} - 1}{a - 1} \times a^1 = \frac{a^{100} - a}{a - 1} = \frac{1 - a}{a - 1} = -1$ .

5.4 f) En réordonnant les facteurs et en développant, on obtient :

$$(2 - a^1)(2 - a^4)(2 - a^2)(2 - a^3) = (5 - 2(a + a^4))(5 - 2(a^2 + a^3)) = 25 - 10(a + a^2 + a^3 + a^4) + 4(a + a^4)(a^2 + a^3).$$

Or  $a + a^2 + a^3 + a^4 = -1$  et  $(a + a^4)(a^2 + a^3) = a^3 + a^6 + a^4 + a^7 = a + a^2 + a^3 + a^4 = -1$  aussi.

5.5 a) On complète le carré :  $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$ .

5.5 b) On se ramène au résultat précédent :  $x^3 - \frac{1}{x^3} = x\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{x}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right) = a(a^2 + 2) + a$ .

5.5 c) De même :  $x^4 + \frac{1}{x^4} = x^2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x^2}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 2 = (a^2 + 2)^2 - 2$ .

5.6 a) On développe  $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$  puis on conclut par soustraction.

5.6 b) On reconnaît  $x(xy + zx) + y(yz + xy) + z(zx + yz) = (x + y + z)(xy + yz + zx) - 3xyz$ .

5.6 c) Le développement  $(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3[x^2(y + z) + y^2(z + x) + z^2(x + y)] + 6xyz$  conduit par soustraction à  $a^3 - 3(ab - 3c) - 6c$  d'après l'expression précédente.

5.6 d) Première solution : on développe et on obtient une combinaison des expressions précédentes.

Deuxième solution : on reconnaît  $(a - z)(a - x)(a - y) = a^3 - (x + y + z)a^2 + (xy + yz + zx)a - xyz$ .

5.6 e) En factorisant, on reconnaît  $(x + y + z)xyz$ .

5.6 f) On se ramène à  $(xy)^2 + (yz)^2 + (zx)^2 = (xy + yz + zx)^2 - 2(x^2yz + y^2xz + z^2xy)$ .

5.7 a) On cherche  $x^2(xy + zx) + y^2(yz + xy) + z^2(zx + yz)$ , c'est-à-dire  $(x^2 + y^2 + z^2)(xy + yz + zx) - x^2yz - y^2zx - z^2xy$ .

5.7 b) Première solution : on développe  $(x + y + z)^4$  puis on conclut par soustraction à l'aide des calculs précédents.

Deuxième solution : on remarque qu'il s'agit de calculer  $(x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2 = (x^2 + y^2 + z^2)^2 - 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2)$ , donc qu'il suffit de développer  $(a^2 - 2b)^2 - 2(b^2 - 2ac)$ .

5.7 c) On réduit au même dénominateur  $(x - y)(y - z)(z - x)$  puis on développe le numérateur.

**5.7 d)** On réduit au même dénominateur  $(x - y)(y - z)(z - x)$  puis on factorise le numérateur par  $(z - y)$  :

$$\begin{aligned}x^2(z - y) + y^2(x - z) + z^2(y - x) &= x^2(z - y) + (y^2 - z^2)x - yz(y - z) \\&= (z - y)[x^2 - (y + z)x + yz],\end{aligned}$$

et l'on reconnaît pour le dernier facteur :  $x^2 - (y + z)x + yz = (x - y)x - (x - y)z = (x - y)(x - z)$ .

**5.7 e)** On procède de même :

$$\begin{aligned}x^3(z - y) + y^3(x - z) + z^3(y - x) &= x^3(z - y) + (y^3 - z^3)x - yz(y^2 - z^2) \\&= (z - y)[x^3 - (y^2 + yz + z^2)x + yz(y + z)] \\&= (z - y)[(x^2 - y^2)x - yz(x - y) - z^2(x - y)] \\&= (z - y)(x - y)[(x + y)x - yz - z^2] \\&= (z - y)(x - y)[(x^2 - z^2) + (x - z)y] \\&= (z - y)(x - y)(x - z)[(x + z) + y],\end{aligned}$$

d'où  $x + y + z = a$  après simplification par le dénominateur.

## Fiche n° 6. Équations du second degré

### Réponses

6.1 a)  $[3, 3]$  @par 6.1 b)  $[-1/3, -1/3]$  @par 6.1 c)  
 $[2, -6]$  @par 6.1 d) .....  $[2, 3]$  @par 6.1 e) .....  
 $0$ , donc  $5$  @par 6.1 f)  $[0, \text{donc } -3/2]$  @par 6.1 g)  
 $\emptyset$  @par 6.1 h) .....  $[1 \text{ donc } -5]$  @par 6.1 i) .....  
 $1 \text{ donc } 8/3$  @par 6.1 j)  $[-1 \text{ donc } -19/5]$  @par 6.2  
a) ...  $[6, 7]$  @par 6.2 b) ...  $[-3, -5]$  @par 6.2 c) ...  
 $[-7, -11]$  @par 6.2 d) ...  $[-3, 11]$  @par 6.2 e) ...  
 $[a, b]$  @par 6.2 f) ...  $[a - b, a + b]$  @par 6.3 a) ...  
 $[2/3]$  @par 6.3 b)  $[-2/7]$  @par 6.3 c)  $[-1/m]$  @par  
6.3 d) .....  $[2m/(m + 3)]$  @par 6.4 a) .....  
 $1 \text{ donc } (a - b)/(b - c)$  @par 6.4 b) .....  
 $1 \text{ donc } c(a - b)/(a(b - c))$  @par 6.4 c) .....  
 $m \text{ donc } -(m + a + b)$  @par 6.4 d) .....  
 $m \text{ donc } m(a - b)/(b - c)$  @par 6.4 e) .....  
 $m \text{ donc } ab/m$  @par 6.4 f) .....  
 $a + b$  puis  $2ab/(a + b)$ . @par 6.5 a) .....

$x^2 - 22x + 117 = 0$  @par 6.5 b) .....  
 $x^2 - 6x - 187 = 0$  @par 6.5 c) .....  
 $x^2 - 4x + 1 = 0$  @par 6.5 d) .....  
 $x^2 - 2mx + 3 = 0$  @par 6.5 e) .....  
 $2x^2 - (4m + 1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$  @par 6.5  
f) ...  $m^2x^2 + (m - 2m^2)x + (m^2 - m - 2) = 0$  @par  
6.6 a) ...  $m = -3/4$  et  $x = 3/4$  @par 6.6 b) .....  
 $m = -1$  et  $x = -2$ , ou  $m = 7$  et  $x = 2/3$  @par 6.6  
c).  $m = 1$  et  $x = -1$  ou  $m = -1$  et  $x = 1$  @par 6.7  
a) .....  $a = 2$  et  $b = 3$  @par 6.7 b) .....  
 $a = -2$  et  $b = 1$  @par 6.7 c)  $a = -3$  et  $b = 5$  @par  
6.7 d) .....  $a = 1/2$  et  $b = 8$  @par 6.7 e) .....  
 $a = 1$  et  $b = 3\sqrt{7}$  @par 6.8 a) .....  
 $]-\infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$  @par 6.8 b) ....  $[-3, 5]$  @par  
6.8 c) ....  $]-\infty, -1] \cup [2/3, +\infty[$  @par 6.8 d) ....  
 $]-\infty, -1/2[ \cup [4, +\infty[$  @par

### Corrigés

6.1 a) C'est une identité remarquable :  $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ .

6.1 c) Le nombre 2 est racine évidente, l'autre est donc  $-6$  en regardant le produit des racines qui vaut  $-12$ .

6.1 e) La racine 0 est la racine évidente par excellence ; la somme des racines valant ici 5 l'autre racine est 5.

6.1 g) La fonction  $x \mapsto 2x^2 + 3$  est strictement positive car elle est minorée par 3, donc elle ne s'annule pas.

6.2 a) Ici on cherche des racines un peu moins évidentes : on remplace le problème par le problème équivalent de la détermination de deux nombres  $x_1, x_2$  dont le produit vaut 42 et la somme 13. On teste donc les factorisations évidentes de 42, ici  $42 = 6 \times 7$  et  $13 = 6 + 7$ .

6.2 b) On cherche deux nombres dont le produit vaut 15 et la somme  $-8$  : les nombres  $-3$  et  $-5$  conviennent.

6.4 e) En réduisant au même dénominateur de part et d'autre l'équation devient  $m(x^2 + ab) = x(m^2 + ab)$  qui est une équation du second degré. Sur la forme initiale de l'équation on lit que  $m$  est racine évidente, l'autre est donc  $ab/m$ . Peut-être aurait-on pu voir cette racine « évidente » directement ?

6.4 f) Le nombre 0 est bien tentant, mais n'est pas racine de l'équation. En revanche  $a + b$  convient. L'équation se réécrit  $(a + b)(x - a)(x - b) = ab(2x - (a + b))$ , d'où une équation du second degré dont le coefficient devant  $x^2$  vaut  $a + b$  et le terme constant  $2ab(a + b)$ , donc la deuxième solution de cette équation est  $\frac{2ab}{a + b}$ .

**6.5 a)** La somme des racines vaut 22, leur produit 117. L'équation cherchée est donc  $x^2 - 22x + 117 = 0$ .

**6.6 a)** Une équation du second degré admet une racine double si, et seulement si, son discriminant est nul.

Ici, le discriminant vaut  $\Delta = (2m+3)^2 - 4m^2 = 3(4m-3)$ . Ainsi, l'équation admet une racine double si, et seulement si,  $m$  vaut  $-3/4$  ce qui donne  $x = 3/4$ .

**6.6 b)** Ici, le déterminant vaut  $\Delta = 4(m^2 - 6m - 7)$ , donc une racine évidente est  $-1$  donc l'autre vaut  $7$ . Pour  $m = -1$  on trouve  $x = -2$  et pour  $m = 7$  on trouve  $x = 2/3$ .

**6.6 c)** Ici le discriminant vaut  $\Delta = 4((3m+1)^2 - (m+3)^2) = 32(m^2 - 1)$  donc l'équation admet une racine double si et seulement si  $m$  vaut  $1$ , auquel cas l'équation s'écrit  $x^2 + 2x + 1 = 0$  et la racine double est  $-1$ , ou  $m$  vaut  $-1$ , auquel cas l'équation s'écrit  $x^2 - 2x + 1 = 0$  dont la racine double est  $1$ .

**6.8 a)** Un trinôme est du signe du coefficient dominant à l'extérieur de l'intervalle des racines, et du signe opposé entre les racines. Ici, les racines sont  $\sqrt{2}$  et  $1$ , le trinôme est donc strictement positif sur  $]-\infty, 1[ \cup ]\sqrt{2}, +\infty[$  et strictement négatif sur  $]1, \sqrt{2}[$ .

**6.8 b)** Les racines sont  $-5$  et  $3$ . Le trinôme est donc strictement négatif sur  $]-\infty, -3[ \cup ]5, +\infty[$  et strictement positif sur  $]-3, 5[$ .

**6.8 c)** Ici, les racines sont  $-1$  et  $2/3$ . Le trinôme est donc strictement positif sur  $]-\infty, -1[ \cup ]2/3, +\infty[$  et strictement négatif sur  $]-1, 2/3[$ .

**6.8 d)** Le signe d'un quotient est le même que celui d'un produit ! Donc le quotient considéré est strictement positif sur  $]-\infty, -1/2[ \cup ]4, +\infty[$  et strictement négatif sur  $]-1/2, 4[$  (attention à l'annulation du dénominateur!).

## Fiche n° 7. Exponentielle et logarithme

### Réponses

**7.1 a)** ...  $4 \ln 2$  @par **7.1 b)** ...  
 $9 \ln 2$  @par **7.1 c)**  $-3 \ln 2$  @par  
**7.1 d)** ...  $\frac{1}{2} \ln 2$  @par **7.1 e)** ...  
 $3 \ln 2$  @par **7.1 f)** .....  
 $2 \ln 2 + 2 \ln 3$  @par **7.2 a)** .....  
 $- \ln 3 - 2 \ln 2$  @par **7.2 b)** .....  
 $2 \ln 3 - 2 \ln 2$  @par **7.2 c)** .....  
 $\ln 3 + 11 \ln 2$  @par **7.2 d)** .....  
 $3 \ln 5 + 2 \ln 2$  @par **7.2 e)** .....  
 $-2 \ln 5 + 4 \ln 2$  @par **7.2 f)** .....  
 $2 \ln 5 - 2 \ln 2$  @par **7.3** .....  
 $-2 \ln 2 - 2 \ln 5$  @par **7.4 a)** .....  
 $\frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1)$  @par **7.4 b)** .....  
 $17 + 12\sqrt{2}$  @par **7.4 c)**  $0$  @par

**7.4 d)** .  $0$  @par **7.5 a)** .  $8$  @par  
**7.5 b)**  $\frac{1}{2}$  @par **7.5 c)**  $\frac{1}{3}$  @par  
**7.5 d)**  $\frac{1}{9}$  @par **7.5 e)**  $-\frac{1}{2}$  @par  
**7.5 f)**  $\frac{3}{2}$  @par **7.6 a)**  $-2$  @par  
**7.6 b)** ....  $\frac{1}{\ln 2}$  @par **7.6 c)** ....  
 $-17$  @par **7.6 d)** .  $1$  @par **7.6**  
e)  $-1$  @par **7.6 f)**  $e$  @par **7.7**  
a) ....  $\text{impaire}$  @par **7.7 b)** ....  
 $\text{impaire}$  @par **7.7 c)** .....  
 $\text{impaire}$  @par **7.7 d)** .....  
 $\text{impaire}$  @par **7.8 a)** ...  $\mathbb{R}$  @par  
**7.8 b)** ok @par **7.8 c)**  $1$  @par  
**7.8 d)** ....  $-1$  @par **7.9 a)** ....

$x + \ln 2$  @par **7.9 b)** .....  
 $\frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$  @par **7.9 c)** .....  
 $\ln|x-1|$  @par **7.9 d)** .....  
 $-\frac{1}{1+x}$  @par **7.9 e)** .....  
 $(1+x)^x$  @par **7.10 a)** .....  
 $x \geq \frac{\ln 12 + 5}{3}$  @par **7.10 b)** ....  
 $x \in [0, 1]$  @par **7.10 c)** .....  
 $x \geq \frac{2}{e}$  @par **7.10 d)** .....  
 $x \geq -\frac{1}{12}$  @par **7.10 e)**  $\emptyset$  @par  
**7.10 f)** ....  $\frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$  @par

### Corrigés

**7.1 a)** On a  $16 = 4^2 = 2^4$  donc  $\ln 16 = 4 \ln 2$ .

**7.1 c)** On a  $0,125 = \frac{1}{8}$  donc  $\ln 0,125 = -\ln 8 = -3 \ln 2$ .

**7.1 e)** On a  $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$  donc  $\ln 72 - 2 \ln 3 = (3 \ln 2 + 2 \ln 3) - 2 \ln 3 = 3 \ln 2$ .

**7.2 c)** On a  $0,875 = \frac{7}{8}$  donc

$$\begin{aligned} \ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln(0,875) &= (\ln 3 + \ln 7) + 2(\ln 2 + \ln 7) - 3(\ln 7 - \ln 8) \\ &= \ln 3 + 2 \ln 3 + 3 \times 3 \ln 2 = 3 \ln 3 + 11 \ln 2. \end{aligned}$$

**7.3**

On appelle  $A$  ce nombre. On a

$$A = (\ln 1 - \ln 2) + (\ln 2 - \ln 3) + \cdots + (\ln 98 - \ln 99) + (\ln 99 - \ln 100)$$

donc en simplifiant les termes deux par deux finalement il reste  $A = \ln 1 - \ln 100$ , c'est-à-dire  $A = -\ln 100$  où  $100 = 2^2 \times 5^2$ , d'où le résultat  $A = -2(\ln 2 + \ln 5)$

On peut écrire plus rigoureusement ce calcul :

$$\begin{aligned} A &= \sum_{k=1}^{99} \ln \frac{k}{k+1} = \sum_{k=1}^{99} (\ln k - \ln(k+1)) \\ &= \sum_{k=1}^{99} \ln k - \sum_{k=1}^{99} \ln(k+1) = \sum_{k=1}^{99} \ln k - \sum_{j=2}^{100} \ln j \end{aligned}$$

en effectuant le changement d'indice  $j = k + 1$  d'où finalement  $A = \ln 1 - \ln 100 = -2(\ln 2 + \ln 5)$ .

**7.4 a)** On a  $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$  et  $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1$

On a donc

$$\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1) = \frac{7}{16} \ln((1 + \sqrt{2})^2) + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{7}{8} \ln(1 + \sqrt{2}) + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

$$\text{d'où finalement } \alpha = -\frac{7}{8} \ln \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{25}{8} \ln \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1).$$

**7.4 c)** On a  $\gamma = \ln \left( \left( (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) \right)^{20} \right) = \ln \left( \left( (4 - 3)^{20} \right) \right) = 0$

**7.6 b)** On a  $e^{-\ln \ln 2} = e^{(-1) \ln(\ln 2)} = (\ln 2)^{-1} = \frac{1}{\ln 2}$ .

**7.6 e)** On a  $\ln \left( \sqrt{\exp(-\ln e^2)} \right) = \frac{1}{2} \ln \left( \exp(-\ln e^2) \right) = \frac{1}{2} (-\ln e^2) = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$ .

**7.7 a)**  $f_1$  est définie sur  $]-2021, +2021[$  qui est symétrique par rapport à 0 et

$$\forall x \in ]-2021, +2021[, \quad f(-x) = \ln \frac{2021 - x}{2021 + x} = \ln \frac{1}{\frac{2021+x}{2021-x}} = -\ln \frac{2021 + x}{2021 - x} = -f_1(x).$$

**7.7 b)** On a  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \leq |x| < \sqrt{x^2 + 1}$  donc  $f_2$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  on a

$$\begin{aligned} f_2(-x) &= \ln(-x + \sqrt{(-x)^2 + 1}) \\ &= \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ &= \ln \frac{(-x + \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \\ &= \ln \frac{-x^2 + (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -f_2(x). \end{aligned}$$

**7.10 f)** Attention à l'ensemble de définition de ces deux équations...

Pour la première équation, on cherche les solutions dans  $]-\infty, -5[ \cap (]61, +\infty[ \cap ]-\infty, -7[)$ , qui est l'ensemble vide, donc la première équation n'admet aucune solution.

Pour la seconde, on cherche les solutions dans  $]-\infty, -5[ \cap (]-\infty, -7[ \cup ]61, +\infty[)$ , c'est-à-dire dans l'intervalle  $]-\infty, -7[$ . Dans ce cas, un réel  $x$  appartenant à  $]-\infty, -7[$  est solution de l'équation si et seulement si  $x$  vérifie  $x^2 + 13x - 26 = 0$ . Or, ce trinôme admet deux racines réelles :  $x_1 = \frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$  et  $x_2 = \frac{-13 + \sqrt{273}}{2}$ . Seul  $x_1$  convient car  $x_1 \in ]-\infty, -7[$  et  $x_2 \notin ]-\infty, -7[$ .

## Fiche n° 8. Trigonométrie

### Réponses

8.1 a) ....  $0$  @par 8.1 b) ....  $0$  @par 8.1 c) ....  $-1 - \sqrt{3}$  @par 8.1 d).  $-\frac{1}{2}$  @par 8.2 a).  $0$  @par 8.2 b).  $-\sin x$  @par 8.2 c).  $2 \cos x$  @par 8.2 d).  $-2 \cos x$  @par 8.3 a) ..  $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$  @par 8.3 b) ..  $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$  @par 8.3 c) ..  $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$  @par 8.3 d) ..  $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$  @par 8.4 a) ....  $-\sin x$  @par 8.4 b) ....  $\frac{1}{\cos x}$  @par 8.4 c) .....  $0$  @par 8.4 d) .....  $4 \cos^3 x - 3 \cos x$  @par 8.5 a)  $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$  @par 8.5 b).  $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$  @par 8.6 a).  $\tan x$  @par 8.6 b).  $2$  @par 8.6 c)  $8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$  @par 8.7 a)  $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$  @par 8.7 a) ..  $\left\{ -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right\}$  @par 8.7 a) ..  $\left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 b)  $\left\{ \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$  @par 8.7 b).  $\left\{ -\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3} \right\}$  @par 8.7 b)  $\left\{ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 c)  $\left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$  @par 8.7 c).  $\left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6} \right\}$  @par 8.7 c) ..  $\left\{ \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 d)  $\left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$  @par 8.7 d)  $\left\{ -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$  @par 8.7 d) ..  $\left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 e) .....  $\left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$  @par 8.7 e) .....  $\left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$  @par 8.7 e) .....  $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 f) .....  $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$  @par 8.7 f) .....  $\left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$  @par 8.7 f) ..

$\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 g) ..  $\left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\}$  @par 8.7 g) .....  $\left\{ -\frac{11\pi}{12}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12} \right\}$  @par 8.7 g) .....  $\left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 h) ..  $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right\}$  @par 8.7 h) ..  $\left\{ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$  @par 8.7 h) ..  $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 i) .....  $\left\{ \frac{\pi}{7}, \frac{13\pi}{7} \right\}$  @par 8.7 i) ..  $\left\{ -\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{7} \right\}$  @par 8.7 i) ..  $\left\{ \frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.7 j) ..  $\left\{ \frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14} \right\}$  @par 8.7 j) ..  $\left\{ \frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14} \right\}$  @par 8.7 j) ..  $\left\{ \frac{5\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{9\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  @par 8.8 a) ..  $\left[ 0, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{4}, 2\pi \right]$  @par 8.8 a)  $\left[ -\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]$  @par 8.8 b) ..  $\left[ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right]$  @par 8.8 b) ..  $\left[ -\pi, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{3}, \pi \right]$  @par 8.8 c) ..  $\left[ 0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}, 2\pi \right]$  @par 8.8 c) ..  $\left[ -\pi, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}, \pi \right]$  @par 8.8 d) ..  $\left[ 0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{11\pi}{6}, 2\pi \right]$  @par 8.8 d) ..  $\left[ -\pi, -\frac{5\pi}{6} \right] \cup \left[ -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}, \pi \right]$  @par 8.8 e) ..  $\left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right]$  @par 8.8 e) ..  $\left[ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$  @par 8.8 f) ..  $\left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{7\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right]$  @par 8.8 f) ..  $\left[ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \right] \cup \left[ -\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right]$  @par 8.8 g) ..  $\left[ 0, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{7\pi}{4}, 2\pi \right]$  @par 8.8 g) ..

$$\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right] \text{@par 8.8 h) ....}$$

$$\left[-\pi, -\frac{5\pi}{8}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \pi\right] \text{@par}$$

$$\left[0, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi\right] \text{@par 8.8 h) ....}$$

## Corrigés

**8.3 b)** On peut utiliser  $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$  puis les formules d'addition.

**8.4 b)** On a

$$\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{\sin 2x \cos x - \cos 2x \sin x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(2x - x)}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\cos x}.$$

On peut aussi faire cette simplification à l'aide des formules de duplication :

$$\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x} - \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}$$

**8.4 d)** On calcule

$$\begin{aligned} \cos(3x) &= \cos(2x + x) = \cos(2x) \cos x - \sin(2x) \sin x = (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \cos x \sin^2 x \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x(1 - \cos^2 x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x. \end{aligned}$$

**8.5 a)** On a  $\cos \frac{\pi}{4} = 2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - 1$  donc  $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2} = \frac{\sqrt{2} + 2}{4}$ . De plus,  $\cos \frac{\pi}{8} \geq 0$  donc  $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$ .

**8.5 b)** On a  $\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$  et  $\sin \frac{\pi}{8} \geq 0$  donc  $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$ .

**8.6 a)** On a  $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$  donc  $\frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \tan x$ .

**8.6 b)** On a  $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = \frac{\sin 3x \cos x - \cos 3x \sin x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(3x - x)}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(2x)}{\sin x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x \cos x} = 2$ .

**8.6 c)** On a  $\cos(4x) = 2 \cos^2(2x) - 1 = 2(2 \cos^2 x - 1)^2 - 1 = 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$ .

**8.7 e)** Cela revient à résoudre «  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  ou  $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  ».

**8.7 g)** Si on résout avec  $x \in [0, 2\pi]$ , alors  $t = 2x \in [0, 4\pi]$ .

Or, dans  $[0, 4\pi]$ , on a  $\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}$  pour  $t \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{23\pi}{6}\right\}$  et donc pour  $x \in \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right\}$ .

**8.7 h)**  $\sin x$  est solution de l'équation de degré 2 :  $2t^2 + t - 1 = 0$  dont les solutions sont  $t = -1$  et  $t = \frac{1}{2}$ . Ainsi, les  $x$  solutions sont les  $x$  tels que  $\sin x = -1$  ou  $\sin x = \frac{1}{2}$ .

**8.7 j)** On a  $\cos \frac{\pi}{7} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}\right) = \sin \frac{5\pi}{14}$ . Finalement, on résout  $\sin x = \sin \frac{5\pi}{14}$ .

**8.8 d)** Cela revient à résoudre  $-\frac{1}{2} \leq \sin x \leq \frac{1}{2}$ .

**8.8 f)** On résout «  $\tan x \geq 1$  ou  $\tan x \leq -1$  ».

**8.8 g)** Si  $x \in [0, 2\pi]$ , alors  $t = x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, 2\pi - \frac{\pi}{4}\right]$ . On résout donc  $\cos t \geq 0$  pour  $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, 2\pi - \frac{\pi}{4}\right]$  ce qui donne  $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right]$  et donc  $x \in \left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$ .

**8.8 h)** Si  $x \in [0, 2\pi]$ , alors  $t = 2x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, 4\pi - \frac{\pi}{4}\right]$ . On résout donc  $\cos t \geq 0$  pour  $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, 4\pi - \frac{\pi}{4}\right]$  ce qui donne  $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{2}, \frac{15\pi}{4}\right]$  puis  $x \in \left[0, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi\right]$ .

## Fiche n° 9. Déivation

### Réponses

**9.1 a)** ..... 
$$6x^2 + 2x - 11$$
 @par **9.1 b)** ..... 
$$5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$$
 @par **9.1 c)** ..... 
$$(2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$$
 @par **9.1 d)** ..... 
$$(6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$$
 @par **9.2 a)** ..... 
$$5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$$
 @par **9.2 b)** ..... 
$$4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$$
 @par **9.2 c)** ..... 
$$8 \cos^2(x) - 6 \cos(x) \sin(x) - 4$$
 @par **9.2 d)** ..... 
$$-3(3 \cos(x) - \sin(x))^2(3 \sin(x) + \cos(x))$$
 @par **9.3 a)** ..... 
$$\frac{2x}{x^2 + 1}$$
 @par **9.3 b)** ..... 
$$\frac{1}{x \ln(x)}$$
 @par **9.3 c)** ..... 
$$(-2x^2 + 3x + 1) \exp(x^2 + x)$$
 @par **9.3 d)** ..... 
$$6 \cos(2x) \exp(3 \sin(2x))$$
 @par **9.4 a)** ..... 
$$\frac{6x}{(x^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$$
 @par **9.4 b)** ..... 
$$\frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2 + 4)^2} \sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right)$$
 @par **9.4 c)** ..... 
$$\frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$$
 @par **9.4 d)** ... 
$$\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$$
 @par **9.5 a)** ...

**9.5 b)** ..... 
$$\frac{(2x + 3)(2 \sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2 \cos(x)}{(2 \sin(x) + 3)^2}$$
 @par **9.5 c)** ..... 
$$\frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2}$$
 @par **9.5 d)** ..... 
$$-2 \frac{(x^2 + 1) \sin(2x + 1) + x \cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$$
 @par **9.6 a)** ..... 
$$\frac{(4x + 3) \ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$$
 @par **9.6 b)** ..... 
$$2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$
 @par **9.6 c)** ..... 
$$\frac{9}{(9 - x^2)\sqrt{9 - x^2}}$$
 @par **9.6 d)** ..... 
$$\frac{1}{1 - x^2}$$
 @par **9.7 a)** ..... 
$$\frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)}$$
 @par **9.7 b)** ..... 
$$\frac{10x - 5}{(3 - x)^2(2 + x)^2}$$
 @par **9.7 c)** ..... 
$$\frac{2}{x + 1} \left(x + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right)$$
 @par **9.7 d)** ... 
$$\frac{x^2}{(x + 1)^2}$$
 @par **9.7 e)** ..... 
$$\frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}$$
 @par

### Corrigés

**9.1 a)** On calcule :  $f'(x) = (2x + 3)(2x - 5) + (x^2 + 3x + 2) \times 2 = 6x^2 + 2x - 11$ .

**9.1 b)** On calcule :  $f'(x) = (3x^2 + 3)(x^2 - 5) + (x^3 + 3x + 2) \times 2x = 5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$ .

**9.1 c)** On calcule :  $f'(x) = (2x - 2) \exp(2x) + (x^2 - 2x + 6) \times 2 \exp(2x) = (2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$ .

**9.1 d)** On calcule :  $f'(x) = (6x - 1) \ln(x - 2) + (3x^2 - x) \times \frac{1}{x - 2} = (6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$ .

**9.2 a)** On calcule :  $f'(x) = 5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$ .

**9.2 b)** On calcule :  $f'(x) = 2(2x^3 + 4x - 1)(6x^2 + 4) = 4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$ .

**9.2 c)** On calcule :

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2(\sin(x) + 2\cos(x))(\cos(x) - 2\sin(x)) = 2(\sin(x)\cos(x) - 2\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x)\sin(x)) \\&= -6\cos(x)\sin(x) - 4\sin^2(x) + 4\cos^2(x) = -6\cos(x)\sin(x) - 4(1 - \cos^2(x)) + 4\cos^2(x) \\&= 8\cos^2(x) - 6\cos(x)\sin(x) - 4.\end{aligned}$$

**9.2 d)** On calcule :  $f'(x) = 3(3\cos(x) - \sin(x))^2(-3\sin(x) - \cos(x)) = -3(3\cos(x) - \sin(x))^2(3\sin(x) + \cos(x))$ .  
En développant, on trouve :  $f'(x) = -54\cos^2(x)\sin(x) - 78\cos^3(x) - 9\sin(x) + 51\cos(x)$ .

**9.3 a)** On calcule :  $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ . C'est une application directe de la formule de dérivation quand  $f = \ln \circ u$ .

**9.3 b)** On calcule :  $f'(x) = \frac{1/x}{\ln(x)} = \frac{1}{x \ln(x)}$ .

**9.3 c)** On calcule :

$$\begin{aligned}f'(x) &= (-1)\exp(x^2 + x) + (2 - x)\exp(x^2 + x) \times (2x + 1) = (-1 + (2 - x)(2x + 1))\exp(x^2 + x) \\&= (-1 + 4x + 2 - 2x^2 - x)\exp(x^2 + x) = (-2x^2 + 3x + 1)\exp(x^2 + x).\end{aligned}$$

**9.3 d)** On calcule :  $f'(x) = \exp(3\sin(2x))(3 \times 2\cos(2x)) = 6\cos(2x)\exp(3\sin(2x))$ .

**9.4 a)** On calcule :

$$\begin{aligned}f'(x) &= \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) \times \frac{4x(x^2 + 1) - (2x^2 - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) \frac{4x^3 + 4x - 4x^3 + 2x}{(x^2 + 1)^2} \\&= \frac{6x}{(x^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right).\end{aligned}$$

**9.4 b)** On calcule :

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right) \times \frac{2(x^2 + 4) - (2x + 1) \times 2x}{(x^2 + 4)^2} = -\sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right) \times \frac{2x^2 + 8 - 4x^2 - 2x}{(x^2 + 4)^2} \\&= \frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2 + 4)^2} \sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right).\end{aligned}$$

**9.4 c)** On calcule :  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\sin(x)}} \cos(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$ .

**9.4 d)** On calcule :  $f'(x) = \cos(\sqrt{x}) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$ .

**9.5 a)** On calcule :  $f'(x) = \frac{(2x + 3)(2\sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2\cos(x)}{(2\sin(x) + 3)^2}$ . En développant le numérateur, on trouve

$$f'(x) = \frac{-2x^2 \cos(x) + 4x \sin(x) - 6x \cos(x) + 6\sin(x) + 6x + 9}{(2\sin(x) + 3)^2}.$$

**9.5 b)** On calcule :  $f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(3x + 2) - \sqrt{x} \times 3}{(3x + 2)^2} = \frac{\frac{3x + 2}{2\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{(3x + 2)^2} = \frac{3x + 2 - 6x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2} = \frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2}$

**9.5 c)** On calcule :  $f'(x) = \frac{-2\sin(2x + 1) \times (x^2 + 1) - \cos(2x + 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = -2 \frac{(x^2 + 1)\sin(2x + 1) + x\cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$ .

**9.5 d)** On calcule :  $f'(x) = \frac{(4x+3)\ln(x) - (2x^2+3x)\frac{1}{x}}{(\ln(x))^2} = \frac{(4x+3)\ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$

**9.6 a)** On calcule :  $f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right) \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

**9.6 b)** On calcule :  $f'(x) = \frac{\sqrt{9-x^2} - x \frac{1}{2\sqrt{9-x^2}}(-2x)}{\sqrt{9-x^2}^2} = \frac{\sqrt{9-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}}{9-x^2} = \frac{\frac{9-x^2+x^2}{\sqrt{9-x^2}}}{9-x^2} = \frac{9}{(9-x^2)\sqrt{9-x^2}}$

**9.6 c)** On a trois fonctions composées à la suite :  $f = \ln(\sqrt{u})$ . Donc on a, en appliquant deux fois la formule de

dérivée d'une fonction composée :  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u-x}} \times u'(x) \times \frac{1}{\sqrt{u(x)}}$ .

On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} \times \frac{1(x-1) - (x+1) \times 1}{(x-1)^2} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} \\ &= \frac{1}{2 \times \frac{x+1}{x-1}} \times \frac{-2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{-1}{x^2-1} = \frac{1}{1-x^2}. \end{aligned}$$

**9.6 d)** On calcule :  $f'(x) = \frac{\cos(x) \times x - \sin(x) \times 1}{x^2} \times \frac{x}{\sin(x)} = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)}$ .

**9.7 a)** On calcule :  $f'(x) = \frac{-(1)}{(3-x)^2} + \frac{-1}{(2+x)^2} = \frac{(2+x)^2 - (3-x)^2}{(3-x)^2(2+x)^2} = \frac{10x-5}{(3-x)^2(2+x)^2}$ .

**9.7 b)** On calcule :  $f'(x) = 2x - \frac{1}{x+1} = \frac{2x(x+1) - 1}{x+1} = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x+1}$ .

Pour le trinôme  $2x^2 + 2x - 1$ , on calcule  $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times (-1) = 12$ . On a deux racines :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{12}}{2 \times 2} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}.$$

Enfin, on a  $f'(x) = \frac{2(x - \frac{-1-\sqrt{3}}{2})(x - \frac{-1+\sqrt{3}}{2})}{x+1} = \frac{2}{x+1} \left( x + \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) \left( x + \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right)$ .

**9.7 c)** On calcule :  $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+2} - \frac{1 \times (x-1) - (x+2) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+x-2} + \frac{3}{(x-1)^2}$ .

On cherche les racines du trinôme  $x^2 + x - 2$  dont le discriminant est  $\Delta = 1 + 8 = 9$ ; on identifie deux racines  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = 1$ . D'où la forme factorisée :  $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$ .

Alors :  $f'(x) = \frac{2x+1}{(x+2)(x-1)} + \frac{3}{(x-1)^2} = \frac{(2x+1)(x-1)}{(x+2)(x-1)^2} + \frac{3(x+2)}{(x+2)(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2}$ .

Le trinôme  $2x^2 + 2x + 5$  dont le discriminant est  $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times 5 = -36 < 0$  ne se factorise pas dans  $\mathbb{R}$ .

On a :  $f'(x) = \frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2}$ .

**9.7 d)** On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2} + 1 - 2 \frac{1}{x+1} = \frac{1}{(x+1)^2} + 1 - \frac{2}{x+1} = \frac{1 + (x+1)^2 - 2(x+1)}{(x+1)^2} \\ &= \frac{1 + x^2 + 2x + 1 - 2x - 2}{(x+1)^2} = \frac{x^2}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

**9.7 e)** On calcule :  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln(x)) - (1 + \ln(x))\frac{-1}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{\frac{2}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}$ .

## Fiche n° 10. Primitives

### Réponses

<b>10.1 a)</b> $\boxed{\ln t+1 }$ @par <b>10.1 b)</b> $\boxed{-\frac{3}{t+2}}$ @par <b>10.1</b>	<b>10.7 a) .....</b> $\boxed{t + \ln t  - \frac{1}{t}}$ @par <b>10.7 b) .....</b>
<b>c)</b> $\boxed{-\frac{3}{2(t+2)^2}}$ @par <b>10.1 d)</b> $\boxed{-\frac{\cos(4t)}{4}}$ @par <b>10.2</b>	$\boxed{\ln t  - \frac{1}{2t^2}}$ @par <b>10.7 c)</b> . $\boxed{t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}}$ @par <b>10.7</b>
<b>a) .</b> $\boxed{\frac{2}{3}(1+t)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}}}$ @par <b>10.2 b) .</b> $\boxed{\frac{1}{2}e^{2t+1}}$ @par	<b>d) .</b> $\boxed{t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}}$ @par <b>10.7 e)</b> . $\boxed{t - 2\ln t+1 }$ @par
<b>10.2 c) .....</b> $\boxed{\frac{1}{2}\text{Arcsin}(2t)}$ @par <b>10.2 d) .....</b>	<b>10.7 f) ...</b> $\boxed{t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln t+1 }$ @par <b>10.7 g) ...</b>
$\boxed{\frac{1}{3}\text{Arctan}(3t)}$ @par <b>10.3 a)</b> $\boxed{\frac{2}{3}\ln 1+t^3 }$ @par <b>10.3</b>	$\boxed{\frac{1}{2}\ln(1+t^2) - \text{Arctan}(t)}$ @par <b>10.7 h) .....</b>
<b>b) ..</b> $\boxed{\frac{1}{6}(1+2t^2)^{\frac{3}{2}}}$ @par <b>10.3 c) ..</b> $\boxed{-\sqrt{1-t^2}}$ @par	$\boxed{\ln t+1  + \frac{1}{t+1}}$ @par <b>10.8 a) .....</b>
<b>10.3 d) .....</b> $\boxed{\frac{3}{4}(1+7t^2)^{\frac{2}{3}}}$ @par <b>10.3 e) .....</b>	$\boxed{2(t-1) \text{ puis } \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 5t}$ @par <b>10.8 b) .....</b>
$\boxed{\frac{1}{6}\ln(1+3t^2)}$ @par <b>10.3 f) .....</b> $\boxed{-\frac{1}{(1+3t^2)^2}}$ @par	$\boxed{-\frac{1}{t^2}\left(\frac{2}{t}+1\right) \text{ puis } -\frac{1}{t} + \ln t }$ @par <b>10.8 c) .....</b>
<b>10.4 a)</b> $\boxed{\frac{1}{4}\ln^4 t}$ @par <b>10.4 b)</b> $\boxed{2\sqrt{\ln t}}$ @par <b>10.4 c)</b>	$\boxed{\frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{3}{t^4} \text{ puis } \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2t^2}}$ @par <b>10.8 d) .....</b>
$\boxed{\frac{2}{(3-e^{2t})^2}}$ @par <b>10.4 d) ..</b> $\boxed{-\frac{2}{3t^{\frac{3}{2}}}}$ @par <b>10.4 e) ..</b>	$\boxed{-\frac{4}{t^5} - \frac{3}{2}\frac{1}{t^{5/2}} \text{ puis } -\frac{1}{3}\frac{1}{t^3} - \frac{2}{\sqrt{t}}}$ @par <b>10.8 e) .....</b>
$\boxed{\ln 1-e^{-t}+e^t }$ @par <b>10.4 f)</b> $\boxed{-e^{\frac{1}{t}}}$ @par <b>10.5 a)</b>	$\boxed{2e^{2t} - 3e^{-3t} \text{ puis } \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{3}e^{-3t}}$ @par <b>10.8 f) .....</b>
$\boxed{-\frac{1}{3}\cos^3 t}$ @par <b>10.5 b) ...</b> $\boxed{e^{\sin t}}$ @par <b>10.5 c) ...</b>	$\boxed{3e^{3t-2} \text{ puis } \frac{1}{3}e^{3t-2}}$ @par <b>10.8 g) .....</b>
$\boxed{-\ln \cos t }$ @par <b>10.5 d)</b> $\boxed{-\ln 1-\sin t }$ @par <b>10.5</b>	$\boxed{-\frac{t(t^3+2)}{(t-1)^2(t^2+t+1)^2} \text{ puis } \frac{1}{3}\ln( t^3-1 )}$ @par <b>10.8</b>
<b>e)</b> $\boxed{-2\cos\sqrt{t}}$ @par <b>10.5 f)</b> $\boxed{\frac{1}{\pi}\sin(\pi\ln t)}$ @par <b>10.5</b>	$\boxed{-\frac{3t^2-2t-3}{(t^2+1)^2} \text{ puis } \frac{3}{2}\ln(t^2+1) - \text{Arctan}(t)}$ @par
<b>g)</b> $\boxed{\tan t - t}$ @par <b>10.5 h)</b> $\boxed{\frac{1}{2}\tan^2 t + \ln \cos t }$ @par	<b>10.8 i)</b> $\boxed{\cos t(3\cos^2 t - 2) \text{ puis } -\frac{1}{3}\cos^3 t}$ @par <b>10.8</b>
<b>10.5 i)</b> $\boxed{\frac{1}{4}\tan^4 t}$ @par <b>10.5 j)</b> $\boxed{2\sqrt{\tan t}}$ @par <b>10.5</b>	<b>j)</b> $\boxed{\sinh(t)^2 + \cosh^2(t) \text{ puis } \frac{1}{2}\sinh^2(t)}$ @par <b>10.8 k)</b>
<b>k)</b> $\boxed{-\frac{1}{\tan t}}$ @par <b>10.5 l)</b> $\boxed{\frac{1}{2}\frac{1}{(1-\sin t)^2}}$ @par <b>10.5</b>	$\boxed{-\frac{2t\sin\frac{1}{t} + \cos\frac{1}{t}}{t^4} \text{ puis } \cos\frac{1}{t}}$ @par <b>10.8 l) .....</b>
<b>m) .</b> $\boxed{\frac{1}{2}\text{Arctan}(2t)}$ @par <b>10.5 n) .</b> $\boxed{\text{Arctan}(e^t)}$ @par	$\boxed{\frac{2e^t}{(2+e^t)^2} \text{ puis } \ln(2+e^t)}$ @par <b>10.8 m) .....</b>
<b>10.5 o) .....</b> $\boxed{\frac{1}{2}(\text{Arcsin}(t))^2}$ @par <b>10.5 p) .....</b>	$\boxed{\frac{2\cos t + 3}{(2+3\cos t)^2} \text{ puis } -\frac{1}{3}\ln 2+3\cos t }$ @par <b>10.8 n) .</b>
$\boxed{\ln \text{Arcsin}(t) }$ @par <b>10.6 a)</b> .....	$\boxed{\frac{1}{(1-t^2)^{3/2}} \text{ puis } -\sqrt{1-t^2}}$ @par <b>10.8 o) .....</b>
<b>10.6 b) .....</b> $\boxed{-\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4}}$ @par <b>10.6 c) .....</b>	$\boxed{\frac{3\cos^2 t - 1}{(1+\cos^2 t)^2} \text{ puis } -\ln(1+\cos^2(t))}$ @par <b>10.8 p) .</b>
$\boxed{-\cos t + \frac{1}{3}\cos^3 t}$ @par <b>10.6 d)</b> $\boxed{\ln(1+\sin^2 t)}$ @par	$\boxed{(1-2t^2)e^{-t^2} \text{ puis } -\frac{1}{2}e^{-t^2}}$ @par <b>10.8 q) .....</b>
<b>10.6 e) .....</b> $\boxed{\ln \tan t }$ @par <b>10.6 f) .....</b>	
$\boxed{-\text{cotant} + \tan t}$ @par <b>10.6 g) ..</b> $\boxed{\frac{1}{4}\ln \tan 2t }$ @par	

$$\frac{\ln t - 2}{t^2} \text{ puis } \ln t - \frac{1}{2} \ln^2 t \quad @\text{par 10.8 r).....}$$

$$-\frac{1 + \ln t}{t^2 \ln^2 t} \text{ puis } \ln |\ln t| \quad @\text{par 10.8 s).....}$$

$$\frac{\cos \ln t - \sin \ln t}{t^2} \text{ puis } -\cos(\ln t) \quad @\text{par 10.8 t).....}$$

$$-\frac{e^t(e^{2t} - 1)}{(1 + e^{2t})^2} \text{ puis Arctan}(e^t) \quad @\text{par}$$

## Corrigés

**10.1 a)** Admet des primitives sur  $]-\infty, -1[$  ou  $]-1, +\infty[$ .

**10.1 b)** Admet des primitives sur  $]-\infty, -2[$  ou  $]-2, +\infty[$ .

**10.1 c)** Admet des primitives sur  $]-\infty, -2[$  ou  $]-2, +\infty[$ .

**10.1 d)** Admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

**10.2 a)** Admet des primitives sur  $]0, +\infty[$ .

**10.2 b)** Admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

**10.2 c)** Admet des primitives sur  $]-1/2, 1/2[$ .

**10.2 d)** Admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

$$\mathbf{10.5 \ g)} \quad \int^t \tan^2 \theta \, d\theta = \int^t ((1 + \tan^2 \theta) - 1) \, d\theta = \tan t - t + \text{cte}$$

$$\mathbf{10.5 \ h)} \quad \int^t \tan^3 \theta \, d\theta = \int^t ((\tan^2 \theta + 1) \tan \theta - \tan \theta) \, d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 t + \ln |\cos t| + \text{cte}$$

$$\mathbf{10.6 \ a)} \quad \int^x \cos^2 \theta \, d\theta = \int^t \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} + \text{cte}$$

**10.6 b)** On a

$$\begin{aligned} \int^t \cos(\theta) \sin(3\theta) \, d\theta &= \int^t \frac{1}{2} (\sin(3\theta + \theta) + \sin(3\theta - \theta)) \, d\theta \\ &= \int^t \frac{1}{2} (\sin(4\theta) + \sin(2\theta)) \, d\theta = -\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4} + \text{cte.} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.6 \ c)} \quad \int^t \sin^3 \theta \, d\theta = \int^t (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta = -\cos t + \frac{1}{3} \cos^3 t + \text{cte}$$

$$\mathbf{10.6 \ d)} \quad \int^t \frac{\sin(2\theta)}{1 + \sin^2 \theta} \, d\theta = \int^t \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{1 + \sin^2 \theta} \, d\theta = \ln(1 + \sin^2 t) + \text{cte}$$

$$\mathbf{10.6 \ e)} \quad \int^t \frac{d\theta}{\sin \theta \cos \theta} = \int^t \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \, d\theta = \int^t \left( \frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right) \, d\theta = \ln |\sin t| - \ln |\cos t| + \text{cte} = \ln |\tan t| + \text{cte}$$

$$\mathbf{10.6 \ f)} \quad \int^t \frac{d\theta}{\sin^2(\theta) \cos^2(\theta)} = \int^t \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2(\theta) \cos^2(\theta)} \, d\theta = \int^t \left( \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} \right) \, d\theta = -\cotan(t) + \tan(t) + \text{cte}$$

**10.6 g)** On a

$$\begin{aligned}\int^t \frac{d\theta}{\sin(4\theta)} &= \int^t \frac{\cos^2(2\theta) + \sin^2(2\theta)}{2\sin(2\theta)\cos(2\theta)} d\theta \\ &= \int^t \frac{1}{4} \left( \frac{2\cos(2\theta)}{\sin(2\theta)} + \frac{2\sin(2\theta)}{\cos(2\theta)} \right) d\theta = \frac{1}{4} \ln |\sin(2t)| - \frac{1}{4} \ln |\cos(2t)| + \text{cte} = \frac{1}{4} \ln |\tan 2t| + \text{cte}.\end{aligned}$$

**10.7 c)** On a  $1 - t^6 = 1^3 - (t^2)^3 = (1 - t^2)(1 + t^2 + t^4)$  donc finalement on cherche une primitive de  $1 + t^2 + t^4$ .

$$\text{10.7 e)} \quad \int^t \frac{\theta - 1}{\theta + 1} d\theta = \int^t \frac{\theta + 1 - 2}{\theta + 1} d\theta = \int^t \left( 1 - \frac{2}{\theta + 1} \right) d\theta = t - 2 \ln |t + 1| + \text{cte}$$

$$\text{10.7 f)} \quad \int^t \frac{\theta^3}{\theta + 1} d\theta = \int^t \frac{\theta^3 + 1 - 1}{\theta + 1} d\theta = \int^t \frac{(\theta + 1)(1 - \theta + \theta^2) - 1}{\theta + 1} d\theta = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln |t + 1| + \text{cte}$$

$$\text{10.7 h)} \quad \int^t \frac{\theta}{(\theta + 1)^2} d\theta = \int^t \frac{\theta + 1 - 1}{(\theta + 1)^2} d\theta = \int^t \left( \frac{1}{\theta + 1} - \frac{1}{(\theta + 1)^2} \right) d\theta = \ln |t + 1| + \frac{1}{t + 1} + \text{cte}$$

## Fiche n° 11. Calcul d'intégrales

### Réponses

11.1 a)  $\boxed{\text{Positif}}$  @par  
 11.1 b)  $\boxed{\text{Négatif}}$  @par  
 11.1 c)  $\boxed{\text{Positif}}$  @par  
 11.2 a)  $\boxed{14}$  @par **11.2**  
 b)  $\boxed{50}$  @par **11.2 c)**  
 $\boxed{\frac{147}{2}}$  @par **11.2 d)**  
 $\boxed{-54}$  @par **11.2 e)**  
 $\boxed{0}$  @par **11.2 f)**  
 $\boxed{\frac{5}{2}}$  @par **11.3 a)**  
 $\boxed{8}$  @par **11.3 b)**  
 $\boxed{-2}$  @par **11.3 c)**  
 $\boxed{\frac{8}{3}}$  @par **11.3 d)**  
 $\boxed{0}$  @par **11.3 e)**

$\boxed{-\frac{1}{30}}$  @par **11.3 f)**  
 $\boxed{-\frac{2}{101}}$  @par **11.4 a)**  
 $\boxed{0}$  @par **11.4 b)**  
 $\boxed{1}$  @par **11.4 c)**  
 $\boxed{\frac{1}{2}}$  @par **11.4 d)**  
 $\boxed{18}$  @par **11.4 e)**  
 $\boxed{e^2 - e^{-3}}$  @par **11.4 f)**  
 $\boxed{-\ln 3}$  @par **11.5 a)**  
 $\boxed{78}$  @par **11.5 b)**  
 $\boxed{2(e^3 - 1)}$  @par **11.5**  
 c)  $\boxed{\frac{1}{\pi} \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)}$  @par  
 11.5 d)  $\boxed{\frac{\sqrt{2}}{6}}$  @par

11.5 e)  $\boxed{6}$  @par **11.5**  
 f)  $\boxed{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}}$  @par **11.6**  
 a)  $\boxed{0}$  @par **11.6 b)**  
 $\boxed{0}$  @par **11.6 c)**  
 $\boxed{\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)}$  @par **11.6**  
 d)  $\boxed{-\frac{1}{384}}$  @par **11.6 e)**  
 $\boxed{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)}$  @par **11.6**  
 f)  $\boxed{\frac{7}{48}}$  @par **11.7 a)**  
 $\boxed{\frac{1}{2} - \frac{1}{e+1}}$  @par **11.7**  
 b)  $\boxed{\frac{17}{2}}$  @par **11.7 c)**

$\boxed{e^2}$  @par **11.7 d)**  
 $\boxed{3e - 4}$  @par **11.7 e)**  
 $\boxed{-\frac{1}{3}}$  @par **11.7 f)**  
 $\boxed{\frac{5}{8}}$  @par **11.8 a)**  
 $\boxed{0}$  @par **11.8 b)**  
 $\boxed{\frac{\pi}{4}}$  @par **11.8 c)**  
 $\boxed{\frac{99}{\ln 10}}$  @par **11.8 d)**  
 $\boxed{e - \frac{1}{e}}$  @par **11.8 e)**  
 $\boxed{\frac{2}{3}}$  @par **11.8 f)**  
 $\boxed{\frac{2\pi}{9}}$  @par

### Corrigés

11.1 a) On intègre une fonction positive et les bornes sont « dans le bon sens ».

11.1 b)  $\int_5^{-3} |\sin 7x| dx = - \int_{-3}^5 |\sin 7x| dx$ . Cette dernière intégrale a ses bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire. Elle est positive car on intègre une fonction positive.

11.1 c)  $\int_0^{-1} \sin x dx = - \int_{-1}^0 \sin x dx$ . Cette dernière intégrale a ses bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire.  $\sin$  est négative sur  $[-\pi, 0]$  donc sur  $[-1, 0]$ ,  $\int_{-1}^0 \sin x dx$  est donc négative.

11.2 a) Il s'agit de l'aire d'un rectangle de largeur 2 et de longueur 7.

11.2 b) On commence par mettre les bornes « dans le bon sens » :  $\int_7^{-3} -5 dx = - \int_{-3}^7 -5 dx = \int_{-3}^7 5 dx$ . Cette dernière intégrale est l'aire d'un rectangle dont les côtés mesurent 10 et 5.

11.2 c) Il s'agit de l'aire du triangle dont les sommets sont l'origine  $O$ , le point  $A(7; 0)$  et  $B(7; 21)$ . Ce triangle est rectangle en  $A$  et son aire est  $\frac{1}{2} \times AO \times AB$ .

11.2 d) Les bornes sont « dans le bon sens », on peut donc interpréter l'intégrale comme une aire algébrique. Sur l'intervalle  $[2, 8]$ , la courbe de  $f(x) = 1 - 2x$  est située sous l'axe des abscisses, l'aire algébrique sera négative.

Il s'agit de calculer l'aire du trapèze rectangle dont les sommets sont  $A(2; 0)$ ,  $B(8; 0)$ ,  $C(8; -15)$  et  $D(2; -3)$ . L'aire de ce trapèze rectangle est  $\frac{1}{2} \times AB \times (AD + BC) = \frac{1}{2} \times 6 \times (3 + 15)$ .

**11.2 e)** Avec la relation de Chasles, on a  $\int_{-2}^2 \sin x \, dx = \int_{-2}^0 \sin x \, dx + \int_0^2 \sin x \, dx$ . La fonction sinus étant impaire, les aires algébriques  $\int_{-2}^0 \sin x \, dx$  et  $\int_0^2 \sin x \, dx$  sont opposées, il suit que leur somme est nulle.

**11.2 f)** Les bornes étant « dans le bon sens », on interprète cette intégrale comme une aire algébrique. Cette aire est composée de deux triangles rectangles (les intégrales de  $-2$  à  $0$  et de  $0$  à  $1$ ).

**11.3 a)** Les bornes étant « dans le bon sens », on interprète cette intégrale comme une aire algébrique d'un rectangle.

$$\mathbf{11.3 \, b)} \quad \int_1^3 2x - 5 \, dx = \left[ x^2 - 5x \right]_1^3 = (3^2 - 15) - (1^2 - 5) = -2.$$

$$\mathbf{11.3 \, c)} \quad \int_{-2}^0 x^2 + x + 1 \, dx = \left[ \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-2}^0 = 0 - \left( \frac{1}{3}(-2)^3 + \frac{1}{2}(-2)^2 - 2 \right) = \frac{8}{3}.$$

**11.3 d)** La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à  $0$  est donc nulle.

$$\mathbf{11.3 \, e)} \quad \int_0^1 x^5 - x^4 \, dx = \left[ \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{30}.$$

$$\mathbf{11.3 \, f)} \quad \int_1^{-1} x^{100} \, dx = \left[ \frac{1}{101}x^{101} \right]_1^{-1} = -\frac{2}{101}.$$

**11.4 a)** La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à  $0$  est donc nulle.

$$\mathbf{11.4 \, b)} \quad \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x \, dx = \left[ \sin x \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.$$

$$\mathbf{11.4 \, c)} \quad \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{11.4 \, d)} \quad \int_1^{100} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \left[ 2\sqrt{x} \right]_1^{100} = 18.$$

$$\mathbf{11.4 \, e)} \quad \int_{-3}^2 e^x \, dx = \left[ e^x \right]_{-3}^2 = e^2 - e^{-3}.$$

$$\mathbf{11.4 \, f)} \quad \int_{-3}^{-1} \frac{dx}{x} = \left[ \ln|x| \right]_{-3}^{-1} = -\ln 3.$$

$$\mathbf{11.5 \, a)} \quad \int_{-1}^2 (2x+1)^3 \, dx = \left[ \frac{1}{8}(2x+1)^4 \right]_{-1}^2 = \frac{625}{8} - \frac{1}{8} = 78.$$

$$\mathbf{11.5 \, b)} \quad \int_{-2}^4 e^{\frac{1}{2}x+1} \, dx = \left[ 2e^{\frac{1}{2}x+1} \right]_{-2}^4 = 2(e^3 - 1).$$

$$\mathbf{11.5 \, c)} \quad \int_0^1 \frac{dx}{\pi x+2} = \left[ \frac{1}{\pi} \ln|\pi x+2| \right]_0^1 = \frac{1}{\pi} \ln\left(\frac{\pi+2}{2}\right).$$

$$\mathbf{11.5 \, d)} \quad \int_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} \sin(3x) \, dx = \left[ -\frac{1}{3} \cos(3x) \right]_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\mathbf{11.5 \, e)} \quad \int_0^{33} \frac{1}{\sqrt{3x+1}} \, dx = \left[ \frac{2}{3} \sqrt{3x+1} \right]_0^{33} = \frac{2}{3} (10 - 1) = 6.$$

**11.5 f)** 
$$\int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) dx = \left[-\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)\right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} = -\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

**11.6 a)** 
$$\int_1^3 \frac{x-2}{x^2-4x+5} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 - 4x + 5)\right]_1^3 = 0.$$

**11.6 b)** La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

**11.6 c)** 
$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan x dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin x}{\cos x} x dx = \left[-\ln(\cos x)\right]_0^{\frac{\pi}{6}} = -\ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

**11.6 d)** 
$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x (\cos x)^5 dx = \left[-\frac{1}{6}(\cos x)^6\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^6.$$

**11.6 e)** 
$$\int_0^1 x e^{x^2-1} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2-1}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

**11.6 f)** 
$$\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^4} dx = \left[\frac{1}{2} \frac{-1}{3} \frac{1}{(x^2+1)^3}\right]_0^1 = \frac{7}{48}.$$

**11.7 a)** 
$$\int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 2e^x + 1} dx = \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \left[-\frac{1}{e^x + 1}\right]_0^1 = -\frac{1}{e+1} + \frac{1}{2}.$$

**11.7 b)**  $x+1$  est négatif sur  $[-2, -1]$  et positif sur  $[-1, 3]$ . On en déduit :

$\int_{-2}^3 |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} -x-1 dx + \int_{-1}^3 x+1 dx$ . Ces deux intégrales se calculent avec des primitives ou en les interprétenant comme des aires de triangles.

**11.7 c)** 
$$\int_{-1}^2 \max(1, e^x) dx = \int_{-1}^0 dx + \int_0^2 e^x dx = e^2.$$

**11.7 d)** 
$$\int_1^e \frac{3x-2\ln x}{x} dx = 3 \int_1^e dx - 2 \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = 3(e-1) - 2 \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^e = 3e - 4.$$

**11.7 e)** On calcule

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) \sin(x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2(x) - 1) \sin(x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) \sin(x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx \\ &= -\frac{2}{3} \left[\cos^3(x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\cos(x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

**11.7 f)** 
$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\cos x \sin x| dx = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \left|\frac{1}{2} \sin(2x)\right| dx = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\sin(2x)| dx.$$
 Le signe de  $\sin(2x)$  est négatif sur  $\left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$  et positif sur  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ , il suit que

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\sin(2x)| dx = \int_{-\frac{\pi}{3}}^0 -\sin(2x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \left[\cos(2x)\right]_{-\frac{\pi}{3}}^0 - \frac{1}{2} \left[\cos(2x)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{5}{4}.$$

**11.8 a)** La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

**11.8 b)** 
$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \left[\arctan(x)\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

**11.8 c)** 
$$\int_0^2 10^x dx = \int_0^2 e^{x \ln 10} dx = \left[\frac{1}{\ln 10} e^{x \ln 10}\right]_0^2 = \frac{e^{2 \ln 10} - 1}{\ln 10} = \frac{99}{\ln 10}.$$

$$\mathbf{11.8 \ d)} \quad \int_0^1 \operatorname{ch}(x) \, dx = \left[ \operatorname{sh}(x) \right]_0^1 = \operatorname{sh}(1) = \frac{e - \frac{1}{e}}{2}.$$

$$\mathbf{11.8 \ e)} \quad \int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} \, dx = \left[ \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

$$\mathbf{11.8 \ f)} \quad \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{2}{1 + 9x^2} \, dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{1}{1 + (3x)^2} \, dx = 2 \left[ \frac{1}{3} \arctan(3x) \right]_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{2}{3} \arctan(\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{9}.$$

## Fiche n° 12. Intégration par parties

### Réponses

12.1 a) .....  $\boxed{\frac{\pi}{2} - 1}$  @par 12.1 b) .....  $\boxed{\frac{5}{2}\text{ch}(2) - \frac{1}{2}\text{sh}(2) - \frac{3}{2}}$  @par 12.1 c) .  $\boxed{4}$  @par 12.1 d)  $\boxed{\frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2\ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2}}$  @par 12.1 e)  $\boxed{1}$  @par 12.1 f) .....  $\boxed{2\ln 2 - \frac{3}{4}}$  @par 12.1 g) .....  $\boxed{\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}}$  @par 12.1 h)  $\boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}$  @par 12.1 i)  $\boxed{\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1}$  @par 12.1 j)  $\boxed{-\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3}}$  @par 12.1 k) .....  $\boxed{\frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9}}$  @par 12.1 l) .....  $\boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi^2}{32}}$  @par 12.2 a) .....  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (-x+2)e^x \end{array} \right.}$  @par 12.2 b) .....

12.2 c) .....  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -\frac{1 + \ln x}{x} \end{array} \right.}$  @par 12.2 d) ..  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \end{array} \right.}$  @par 12.3 a)  $\boxed{\frac{5}{2} - e^2}$  @par 12.3 b) .....  $\boxed{\frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}}$  @par 12.4 a) .....  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}(-\cos(x)\text{sh}(x) + \sin(x)\text{ch}(x)) \end{array} \right.}$  @par 12.4 b) .  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x \end{array} \right.}$  @par 12.4 c) .  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^3 \left( \frac{1}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} \ln x + \frac{2}{27} \right) \end{array} \right.}$  @par 12.4 d) .....  $\boxed{\left\{ \begin{array}{l} ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} e^{\arccos(x)} \left( x - \sqrt{1 - x^2} \right) \end{array} \right.}$  @par

### Corrigés

12.1 a) On choisit  $u'(t) = \cos t$  et  $v(t) = t$ .  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt = [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = \frac{\pi}{2} - 1$ .

12.1 b) On choisit  $u'(t) = \text{sh}(2t)$  et  $v(t) = 2t + 3$ .

$$\int_0^1 (2t+3)\text{sh}(2t) dt = \left[ (2t+3) \frac{\text{ch}(2t)}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 \text{ch}(2t) dt = \frac{5}{2}\text{ch}(2) - \frac{3}{2} - \frac{\text{sh}(2)}{2}.$$

12.1 c) On choisit  $v(t) = t$  et  $u'(t) = e^{\frac{t}{2}}$ .  $\int_0^2 t e^{\frac{t}{2}} dt = \left[ 2t e^{\frac{t}{2}} \right]_0^2 - 2 \int_0^2 e^{\frac{t}{2}} dt = 4e - 4 \left[ e^{\frac{t}{2}} \right]_0^2 = 4$ .

12.1 d) On choisit  $v(t) = t$  et  $u'(t) = 2^t$ .  $\int_1^{\ln(2)} t 2^t dt = \int_1^{\ln(2)} t e^{t \ln(2)} dt = \left[ t \frac{1}{\ln(2)} 2^t \right]_1^{\ln(2)} - \frac{1}{\ln(2)} \int_1^{\ln(2)} e^{t \ln(2)} dt = 2^{\ln(2)} - \frac{2}{\ln(2)} - \frac{1}{(\ln(2))^2} [2^t]_1^{\ln(2)} = \frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2 \ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2}$ .

12.1 e) On choisit  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \ln t$ .  $\int_1^e \ln t dt = [t \ln t]_1^e - \int_1^e 1 dt = e - (e - 1) = 1$ .

12.1 f) On choisit  $u'(t) = t$  et  $v(t) = \ln t$ .  $\int_1^2 t \ln t dt = \left[ \frac{1}{2} t^2 \ln t \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{2} t dt = 2 \ln 2 - \frac{1}{4} [t^2]_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}$ .

12.1 g) On choisit  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \ln(1 + t^2)$ .

$$\int_0^1 \ln(1+t^2) dt = [t \ln(1+t^2)]_0^1 - 2 \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt = \ln(2) - 2 \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \ln 2 - 2[t - \arctan(t)]_0^1 = \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

**12.1 h)** On choisit  $u'(t) = t$  et  $v(t) = \arctan t$ . On a

$$\int_0^1 t \arctan t \, dt = \left[ \frac{t^2}{2} \arctan t \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2} \, dt = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{1+t^2} \right) \, dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

**12.1 i)** On choisit  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \arcsin t$ .  $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin t \, dt = [t \arcsin t]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \, dt = \frac{\pi}{12} + \left[ \sqrt{1-t^2} \right]_0^{\frac{1}{2}}.$

**12.1 j)** On choisit  $u'(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t}}$  et  $v(t) = t$ .

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1+t}} \, dt = [2t\sqrt{1+t}]_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{1+t} \, dt = 2\sqrt{2} - \frac{4}{3} \left[ (1+t)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = -\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3}.$$

**12.1 k)** On choisit  $u'(t) = \sqrt{1+t}$  et  $v(t) = \ln(1+t)$ .

$$\int_0^1 \sqrt{1+t} \ln(1+t) \, dt = \left[ \frac{2}{3}(1+t)^{\frac{3}{2}} \ln(1+t) \right]_0^1 - \frac{2}{3} \int_0^1 \sqrt{1+t} \, dt = \frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{2}{3} \left[ \frac{2}{3}(1+t)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9}.$$

**12.1 l)**  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} t \tan^2 t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t(1 + \tan^2 t) \, dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \, dt$ . On choisit dans la première intégrale,  $v(t) = t$  et  $u'(t) = 1 + \tan^2 t$ . On obtient  $[t \tan t]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan t \, dt - \left[ \frac{t^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + [\ln \cos(t)]_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\pi^2}{32} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi^2}{32}$ .

**12.2 a)** Cette fonction est définie sur  $\mathbb{R}$ , y est continue et admet donc des primitives. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , en choisissant

$$u'(t) = e^t \text{ et } v(t) = -t + 1, \text{ on a } \int_0^x (-t+1)e^t \, dt = [(-t+1)e^t]_0^x + \int_0^x e^t \, dt = (-x+1)e^x + e^x - 2. \text{ Ainsi, } x \mapsto (-x+2)e^x \text{ est une primitive sur } \mathbb{R} \text{ de } x \mapsto (-x+1)e^x.$$

**12.2 b)** Cette fonction est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ , y est continue et admet donc des primitives. Soit  $x > 0$ , par intégration

$$\text{par parties avec } u'(t) = \frac{1}{t^2} \text{ et } v(t) = \ln t, \text{ on a } \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} \, dt = \left[ -\frac{\ln t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} \, dt = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1. \text{ Ainsi, } x \mapsto -\frac{\ln x + 1}{x} \text{ est donc une primitive sur } \mathbb{R}_+^* \text{ de } f$$

**12.2 c)** La fonction est définie sur  $\mathbb{R}$  et y est continue. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a en choisissant  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \arctan t$ ,

$$\int_0^x \arctan(t) \, dt = [t \arctan t]_0^x - \int_0^x \frac{t}{1+t^2} \, dt = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2). \text{ D'où une primitive.}$$

**12.2 d)** La fonction est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a, en choisissant  $v(t) = t$  et  $u'(t) = \operatorname{cht}$ ,

$$\int_0^x t \operatorname{cht}(t) \, dt = [t \operatorname{sh}(t)]_0^x - \int_0^x \operatorname{sh}(t) \, dt = x \operatorname{sh}(x) - \operatorname{ch}(x) + 1. \text{ D'où une primitive.}$$

**12.3 a)** On effectue deux intégrations par parties successives : pour la première,  $u'(t) = e^{2t}$  et  $v(t) = t^2 + 3t - 4$  et ainsi  $\int_0^1 (t^2 + 3t - 4)e^{2t} \, dt = \left[ (t^2 + 3t - 4) \frac{e^{2t}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 (2t+3) \frac{e^{2t}}{2} \, dt$ . Puis, seconde intégration par parties avec,  $v(t) = 2t+3$  et  $u'(t) = \frac{e^{2t}}{2}$  d'où  $-\int_0^1 (2t+3) \frac{e^{2t}}{2} \, dt = 2 - \left[ (2t+3) \frac{e^{2t}}{4} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2t} \, dt = \frac{11}{4} - \frac{5}{4}e^2 + \frac{1}{4} [e^{2t}]_0^1 = \frac{5}{2} - e^2$ .

**12.3 b)** On choisit d'abord  $u' = \exp$  et  $v = \sin$  ; d'où  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t \, dt = [e^t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos t \, dt$ . Ensuite  $u' = \exp$  et  $v = \cos$ , d'où  $e^{\frac{\pi}{2}} - [e^t \cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t \, dt$ . Finalement,  $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t \, dt = e^{\frac{\pi}{2}} + 1$ .

**12.4 a)** On effectue deux intégrations par parties successives pour déterminer, pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) \, dt$ . On commence par choisir  $u' = \sin$  et  $v = \operatorname{sh}$  cela donne  $\int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) \, dt = [-\cos(t) \operatorname{sh}(t)]_0^x + \int_0^x \cos(t) \operatorname{ch}(t) \, dt$ . Puis, on choisit  $u' = \cos$  et  $v = \operatorname{ch}$ , ce qui donne  $-\cos(x) \operatorname{sh}(x) + [\sin(t) \operatorname{ch}(t)]_0^x - \int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) \, dt$ . Finalement,

$$\int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) dt = \frac{1}{2}(-\cos(x) \operatorname{sh}(x) + \sin(x) \operatorname{ch}(x)).$$

**12.4 b)** Cette fonction est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  et y est continue. Soit  $x > 0$ , en choisissant  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \ln^2 t$  on obtient  $\int_1^x \ln^2 t dt = [t \ln^2 t]_1^x - \int_1^x 2 \ln t dt$ . Puis, en choisissant  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = \ln t$ , on obtient  $x \ln^2 x - 2[t \ln t]_1^x + 2 \int_1^x 1 dt = x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x - 2$ . Ainsi,  $x \mapsto x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x$  est une primitive sur  $\mathbb{R}_+^*$  de  $x \mapsto \ln^2 x$ .

**12.4 c)** La fonction est définie et continue sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Si  $x > 0$ , alors, avec  $u'(t) = t^2$  et  $v(t) = \ln^2(t)$ , on a :

$$\int_1^x t^2 \ln^2 t dt = \left[ \frac{t^3}{3} \ln^2 t \right]_1^x - \frac{2}{3} \int_1^x t^2 \ln t dt \text{ puis avec } u'(t) = t^2 \text{ et } v(t) = \ln(t), \text{ on obtient} \\ \frac{x^3}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} [t^3 \ln t]_1^x + \frac{2}{9} \int_1^x t^2 dt = \frac{x^3 \ln^2 x}{3} - \frac{2}{9} x^3 \ln x + \frac{2}{27} (x^3 - 1). \text{ D'où une primitive.}$$

**12.4 d)** La fonction est définie et continue sur  $] -1, 1[$ . Si  $x \in ] -1, 1[$ , alors, en posant  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = e^{\arccos(t)}$ , on obtient  $\int_0^x e^{\arccos(t)} dt = [te^{\arccos(t)}]_0^x - \int_0^x \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} e^{\arccos(t)} dt$ , ensuite, en posant  $u'(t) = -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$  et  $v(t) = e^{\arccos(t)}$ , on obtient  $xe^{\arccos(x)} - \left[ \sqrt{1-t^2} e^{\arccos(t)} \right]_0^x + \int_0^x \sqrt{1-t^2} \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}} e^{\arccos(t)} dt = xe^{\arccos(x)} - \sqrt{1-x^2} e^{\arccos(x)} + e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^x e^{\arccos(t)} dt$ . D'où  $\int_0^x e^{\arccos(t)} dt = \frac{1}{2} e^{\arccos(x)} \left( x - \sqrt{1-x^2} \right) + \frac{1}{2} e^{\frac{\pi}{2}}$ .

## Fiche n° 13. Nombres complexes

### Réponses

13.1 a) ...  $4 + 32i$  @par  
 13.1 b) ...  $13 - i$  @par  
 13.1 c) ...  $7 - 24i$  @par  
 13.1 d) ...  $5$  @par **13.1**  
 e) ...  $-119 + 120i$  @par  
 13.1 f)  $\frac{3}{10} + \frac{1}{10}i$  @par

13.1 g)  $\frac{4}{29} - \frac{19}{29}i$  @par  
 13.1 h)  $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$  @par  
 13.2 a)  $12$  @par **13.2**  
 b)  $8e^{i\pi}$  @par **13.2 c)**  
 $\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$  @par **13.2 d)**...

2e $^{-i\frac{\pi}{2}}$  @par **13.2 e)** ...  
 $2e^{i\frac{8\pi}{5}}$  @par **13.2 f)** ...  
 $5\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$  @par **13.2**  
 g) ...  $10e^{i\frac{2\pi}{3}}$  @par **13.2**  
 h)  $2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)e^{i\frac{\pi}{4}}$  @par

13.3 a) ...  $1$  @par **13.3**  
 b) ....  $\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$  @par  
 13.3 c) .....  
 $-\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}$  @par

### Corrigés

**13.1 a)** On développe :  $(2 + 6i)(5 + i) = 10 + 2i + 30i + 6i^2 = 10 + 32i - 6 = 4 + 32i$ .

**13.1 b)** On développe :  $(3 - i)(4 + i) = 12 + 3i - 4i - i^2 = 12 - i + 1 = 13 - i$ .

**13.1 c)** On développe :  $(4 - 3i)^2 = 4^2 - 2 \times 4 \times 3i + (3i)^2 = 16 - 24i - 9 = 7 - 24i$

**13.1 d)** On développe :  $(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 - (2i)^2 = 1 + 4 = 5$ .

Ou bien : en posant  $z = 1 - 2i$ , on reconnaît la quantité  $z\bar{z}$ , c'est-à-dire  $|z|^2$ . Ainsi,  $(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 + 2^2 = 5$ .

**13.1 e)** On développe :

$$(2 - 3i)^4 = ((2 - 3i)^2)^2 = (4 - 2 \times 2 \times 3i - 9)^2 = (-5 - 12i)^2 = (5 + 12i)^2 = 5^2 + 2 \times 5 \times 12i - 12^2 = -119 + 120i.$$

Ou bien : avec la formule du binôme de Newton,

$$\begin{aligned} (2 - 3i)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} 2^k (-3i)^{4-k} \\ &= (-3i)^4 + 4 \times 2 \times (-3i)^3 + 6 \times 2^2 \times (-3i)^2 + 4 \times 2^3 \times (-3i) + 2^4 \\ &= 81 + 216i - 216 - 96i + 16 = -119 + 120i. \end{aligned}$$

**13.1 f)** On utilise l'expression conjuguée :  $\frac{1}{3 - i} = \frac{3 + i}{(3 - i)(3 + i)} = \frac{3 + i}{3^2 + 1^2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}i$

**13.1 g)** On utilise l'expression conjuguée et on développe :

$$\frac{2 - 3i}{5 + 2i} = \frac{(2 - 3i)(5 - 2i)}{(5 + 2i)(5 - 2i)} = \frac{10 - 4i - 15i - 6}{5^2 + 2^2} = \frac{4}{29} - \frac{19}{29}i.$$

**13.1 h)** On utilise la définition de l'écriture exponentielle et la trigonométrie :

$$e^{-i\frac{\pi}{3}} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

**13.2 a)** On a  $|12| = 12$  et  $\arg(12) = 0$ , donc la réponse est  $12$  (ou  $12e^{0i}$ ).

**13.2 b)** On a  $|-8| = 8$  et  $-1 = e^{i\pi}$ .

**13.2 c)** On a  $|\sqrt{3}i| = \sqrt{3}$  et  $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ .

**13.2 d)** On a  $|-2i| = 2$  et  $-i = \bar{i} = e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$ .

**13.2 e)** On écrit que  $-2 = 2e^{i\pi}$  et on utilise les propriétés de l'exponentielle :

$$-2e^{i\frac{3\pi}{5}} = 2e^{i\pi}e^{i\frac{3\pi}{5}} = 2e^{i\pi+i\frac{3\pi}{5}} = 2e^{i\frac{8\pi}{5}}.$$

**13.2 f)** On calcule  $|5 - 5i| = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{2 \times 5^2} = 5\sqrt{2}$  et on écrit

$$5 - 5i = 5\sqrt{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 5\sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

**13.2 g)** On calcule  $|-5 + 5i\sqrt{3}| = \sqrt{25 + 75} = 10$  puis on écrit

$$-5 + 5i\sqrt{3} = 10 \left( -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 10 \left( \cos \left( \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{2\pi}{3} \right) \right).$$

**13.2 h)** On écrit que  $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{4}} \left( e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)} + e^{i\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right)} \right) = e^{i\frac{\pi}{4}} \left( e^{i\frac{\pi}{12}} + e^{-i\frac{\pi}{12}} \right) = 2 \cos \left( \frac{\pi}{12} \right) e^{i\frac{\pi}{4}}$ .

Ainsi,  $|e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}| = 2 \cos \left( \frac{\pi}{12} \right)$  (car  $\cos \left( \frac{\pi}{12} \right) \geq 0$  et  $|e^{i\frac{\pi}{4}}| = 1$ ) et  $\arg(e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}) = \arg(e^{i\frac{\pi}{4}}) = \frac{\pi}{4}$ .

On en déduit que l'écriture exponentielle de  $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}$  est  $2 \cos \left( \frac{\pi}{12} \right) e^{i\frac{\pi}{4}}$ .

**13.3 a)** On remarque que le dénominateur de  $z$  est le conjugué du numérateur. Ainsi,  $|z| = 1$ .

**13.3 b)** De plus, en multipliant par le conjugué, on obtient

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 + \sqrt{2} + i)^2}{(1 + \sqrt{2} - i)(1 + \sqrt{2} + i)} = \frac{(1 + \sqrt{2})^2 + 2(1 + \sqrt{2})i - 1}{(1 + \sqrt{2})^2 + 1} = \frac{1 + 2\sqrt{2} + 2 + 2(1 + \sqrt{2})i - 1}{1 + 2\sqrt{2} + 2 + 1} \\ &= \frac{2 + 2\sqrt{2} + 2(1 + \sqrt{2})i}{4 + 2\sqrt{2}} = \frac{2(1 + \sqrt{2})(1 + i)}{2\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i. \end{aligned}$$

**13.3 c)** Enfin,  $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i = e^{i\frac{\pi}{4}}$ , donc  $z^{2021} = \left( e^{i\frac{\pi}{4}} \right)^{2021} = e^{\frac{2021}{4}i\pi}$ .

Comme  $2021 = 4 \times 505 + 1$ , on a  $e^{\frac{2021}{4}i\pi} = e^{505i\pi + \frac{\pi}{4}i} = e^{505i\pi}e^{\frac{\pi}{4}i} = -e^{i\frac{\pi}{4}}$ .

## Fiche n° 14. Trigonométrie et nombres complexes

### Réponses

14.1 a) ....  $\boxed{\frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x)}$  @par 14.1 b) ....  

$$-\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4}$$
 @par 14.1 c) ....  

$$-\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4}$$
 @par 14.1  
d) .... 
$$-\frac{\sin(9x)}{8} + \frac{3 \sin(5x)}{8} - \frac{\sin(3x)}{8} - \frac{3 \sin(x)}{8}$$
 @par  
14.1 e) ....  

$$\frac{\cos(9x)}{8} + \frac{3 \cos(5x)}{8} + \frac{\cos(3x)}{8} + \frac{3 \cos(x)}{8}$$
 @par 14.1  
f) .... 
$$-\frac{1}{4} \sin(11x) + \frac{1}{4} \sin(5x) + \frac{1}{2} \sin(3x)$$
 @par 14.2  
a) .... 
$$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12}}$$
 @par 14.2 b) ....  

$$\left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right) e^{-i\frac{5\pi}{12}}$$
 @par 14.2 c) ....  

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-\frac{7i\pi}{12}}$$
 @par 14.2 d) 
$$2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) e^{i\frac{5i\pi}{12}}$$
 @par  
14.2 e) .... 
$$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{13\pi}{12}}$$
 @par 14.2 f) ....

14.2 g) .... 
$$2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{-i\frac{11\pi}{24}}$$
 @par 14.2 h) .... 
$$2^{27} \cos^{27}\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{4}}$$
 @par 14.3 a) ....  

$$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{5\pi}{12}}$$
 @par 14.3 b) 
$$2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{11\pi}{12}}$$
 @par  
14.4 a) .... 
$$4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$
 @par 14.4 b) ....  

$$4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x)$$
 @par 14.5 a) ....  

$$2 \cos(2x) \cos(x)$$
 @par 14.5 b) ....  

$$2 \cos(4x) \sin(x)$$
 @par 14.5 c) 
$$2 \sin(x) \sin(2x)$$
 @par  
14.5 d) .... 
$$2 \sin(4x) \cos(x)$$
 @par 14.6 a) ....  

$$\frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right) \sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$
 @par 14.6 b) 
$$\frac{\sin(8x)}{2 \sin(x)}$$
 @par 14.6  
c) ... 
$$0$$
 @par 14.7 a) ... 
$$\frac{e^\pi + 1}{2}$$
 @par 14.7 b) ...  

$$\frac{1}{5}(e^\pi - 2)$$
 @par

### Corrigés

14.1 a) On calcule :

$$\begin{aligned} \cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}(e^{3ix} + 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} + e^{-3ix}) = \frac{1}{8}(e^{3ix} + e^{-3ix}) + \frac{3}{8}(e^{ix} + e^{-ix}) \\ &= \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos x. \end{aligned}$$

14.1 b) On calcule :

$$\begin{aligned} \cos(2x) \sin^2(x) &= \left(\frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2}\right) \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^2 = -\frac{1}{8}(e^{2ix} + e^{-2ix})(e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}) \\ &= -\frac{1}{8}(e^{4ix} + e^{-4ix} - 2(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 2) = -\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

14.1 c) On calcule :

$$\begin{aligned} \cos^2(2x) \sin^2(x) &= \left(\frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2}\right)^2 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^2 = -\frac{1}{16}(e^{4ix} + 2 + e^{-4ix})(e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}) \\ &= -\frac{1}{16}(e^{6ix} - 2e^{4ix} + e^{2ix} + 2e^{2ix} - 4 + 2e^{-2ix} + e^{-2ix} - 2e^{-4ix} + e^{-6ix}) \\ &= -\frac{1}{16}(e^{6ix} + e^{-6ix} - 2(e^{4ix} + e^{-4ix}) + 3(e^{2ix} + e^{-2ix}) - 4) = -\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

**14.1 d)** On calcule :

$$\begin{aligned}
 \cos(3x) \sin^3(2x) &= \left( \frac{e^{3ix} + e^{-3ix}}{2} \right) \left( \frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} \right)^3 = -\frac{1}{16i} (e^{3ix} + e^{-3ix}) (e^{6ix} - 3e^{2ix} + 3e^{-2ix} - e^{-6ix}) \\
 &= -\frac{1}{16i} (e^{9ix} - e^{-9ix} - 3(e^{5ix} - e^{-5ix}) + e^{3ix} - e^{-3ix} + 3(e^{ix} - e^{-ix})) \\
 &= -\frac{1}{8} \sin(9x) + \frac{3}{8} \sin(5x) - \frac{1}{8} \sin(3x) - \frac{3}{8} \sin(x).
 \end{aligned}$$

**14.2 a)**  $1 + e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{12}} \left( e^{-\frac{i\pi}{12}} + e^{i\frac{\pi}{12}} \right) = \underbrace{2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{>0} e^{i\frac{\pi}{12}}.$

**14.2 b)**  $1 + e^{i\frac{7\pi}{6}} = e^{\frac{7i\pi}{12}} \left( e^{-\frac{7i\pi}{12}} + e^{\frac{7i\pi}{12}} \right) = \underbrace{2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)}_{<0} e^{\frac{7i\pi}{12}} = \left( -2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right) e^{\frac{7i\pi}{12}} e^{-i\pi} = \left( -2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right) e^{-i\frac{5\pi}{12}}.$

**14.2 c)**  $e^{-i\frac{\pi}{6}} - 1 = e^{-i\frac{\pi}{12}} (e^{-i\frac{\pi}{12}} - e^{i\frac{\pi}{12}}) = e^{-i\frac{\pi}{12}} \left( -2i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-i\frac{\pi}{12} - i\frac{\pi}{2}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-\frac{7i\pi}{12}}.$

**14.2 d)**  $1 + ie^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + e^{i\frac{5\pi}{6}} = e^{\frac{5i\pi}{12}} \underbrace{2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)}_{>0} = 2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) e^{\frac{5i\pi}{12}}$

**14.2 e)**  $-1 - e^{i\frac{\pi}{6}} = -e^{i\frac{\pi}{12}} (e^{-i\frac{\pi}{12}} + e^{i\frac{\pi}{12}}) = \underbrace{-2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{<0} e^{i\frac{\pi}{12}} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + i\pi} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{13\pi}{12}}.$

**14.2 f)**  $1 - e^{i\frac{\pi}{12}} = e^{i\frac{\pi}{24}} \left( -2i \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) \right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{i\frac{\pi}{24}} e^{-i\frac{\pi}{2}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{-i\frac{11\pi}{24}}.$

**14.2 g)** On fait le quotient de a) et f).

**14.2 h)**  $(1 + e^{i\frac{\pi}{6}})^{27} = \left( 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12}} \right)^{27} = 2^{27} \cos^{27}\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{27\pi}{4}}.$

**14.3 a)**  $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}} \left( e^{i\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}} + e^{i\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}} \right) = \underbrace{2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{>0} e^{i\frac{5\pi}{12}}.$

**14.3 b)**  $e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}} \left( e^{i\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}} - e^{i\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}} \right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) ie^{5i\frac{\pi}{12}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{5i\frac{\pi}{12} + i\frac{\pi}{2}} = \underbrace{2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{>0} e^{i\frac{11\pi}{12}}.$

**14.4 a)** On calcule :

$$\begin{aligned}
 \cos(3x) &= \operatorname{Re}(e^{3ix}) = \operatorname{Re}((e^{ix})^3) = \operatorname{Re}((\cos(x) + i \sin(x))^3) \\
 &= \operatorname{Re}(\cos^3(x) + 3i \cos^2(x) \sin(x) - 3 \cos(x) \sin^2(x) - i \sin^3(x)) \\
 &= \cos^3(x) - 3 \cos(x) \sin^2(x) = \cos^3(x) - 3 \cos(x)(1 - \cos^2(x)) \\
 &= 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x).
 \end{aligned}$$

**14.4 b)** On calcule :

$$\begin{aligned}
 \sin(4x) &= \operatorname{Im}(e^{4ix}) = \operatorname{Im}((e^{ix})^4) = \operatorname{Im}((\cos(x) + i \sin(x))^4) \\
 &= \operatorname{Im}(\cos^4(x) + 4i \cos^3(x) \sin(x) - 6 \cos^2(x) \sin^2(x) - 4i \cos(x) \sin^3(x) + \sin^4(x)) \\
 &= 4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x).
 \end{aligned}$$

**14.5 a)**  $\cos(x) + \cos(3x) = \operatorname{Re}(e^{ix} + e^{3ix}) = \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{x+3x}{2}} (e^{i(-x)} + e^{ix})\right) = \operatorname{Re}(e^{2ix} 2 \cos(x)) = 2 \cos(2x) \cos(x).$

**14.5 b)**  $\sin(5x) - \sin(3x) = \operatorname{Im}(e^{5ix} - e^{3ix}) = \operatorname{Im}(e^{4ix}(e^{ix} - e^{-ix})) = \operatorname{Im}(e^{4ix}2i\sin(x)) = 2\cos(4x)\sin(x).$

**14.5 c)**  $\cos(x) - \cos(3x) = \operatorname{Re}(e^{ix} - e^{3ix}) = \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{x+3x}{2}}(e^{i(-x)} - e^{ix})\right) = \operatorname{Re}(e^{2ix}(-2i)\sin(x)) = 2\sin(x)\sin(2x).$

**14.5 d)**  $\sin(3x) + \sin(5x) = \operatorname{Im}(e^{3ix} + e^{5ix}) = \operatorname{Im}(e^{4ix}(e^{-ix} + e^{ix})) = \operatorname{Im}(e^{4ix}2\cos(x)) = 2\sin(4x)\cos(x).$

**14.6 a)** Si  $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ , alors cette somme vaut 0. Sinon,  $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = \operatorname{Im}(e^{ix} + e^{2ix} + e^{3ix}) = \operatorname{Im}(1 + e^{ix} + (e^{ix})^2 + (e^{ix})^3)$ . Or,  $e^{ix} \neq 1$  donc  $1 + e^{ix} + (e^{ix})^2 + (e^{ix})^3 = \frac{1 - e^{4ix}}{1 - e^{ix}}$ .

On utilise maintenant l'astuce de l'arc moitié. On obtient,

$$\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = \operatorname{Im}\left(\frac{e^{2ix} - 2i\sin(2x)}{e^{i\frac{x}{2}} - 2i\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right) = \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{3x}{2}} \frac{\sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right) = \frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right)\sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

**14.6 b)** Si  $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ , alors cette somme vaut 4.

Si  $x$  est de la forme  $\pi + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ , la somme vaut  $-4$ .

Sinon, on calcule :

$$\begin{aligned} \cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) + \cos(7x) &= \operatorname{Re}(e^{ix} + e^{3ix} + e^{5ix} + e^{7ix}) \\ &= \operatorname{Re}(e^{ix}(1 + (e^{2ix}) + (e^{2ix})^2 + (e^{2ix})^3)). \end{aligned}$$

Or,  $e^{2ix} \neq 1$  donc

$$e^{ix}(1 + (e^{2ix}) + (e^{2ix})^2 + (e^{2ix})^3) = e^{ix} \frac{1 - (e^{2ix})^4}{1 - e^{2ix}} = e^{ix} \frac{1 - (e^{8ix})}{1 - e^{2ix}} = e^{ix} \frac{e^{4ix}}{e^{ix}} \frac{-2i\sin(4x)}{-2i\sin(x)} = e^{4ix} \frac{\sin(4x)}{\sin(x)}.$$

Finalement, on a

$$\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) + \cos(7x) = \frac{\cos(4x)\sin(4x)}{\sin(x)} = \frac{\sin(8x)}{2\sin(x)}.$$

**14.6 c)** On calcule :

$$\cos(x) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \operatorname{Re}\left(e^{ix} + e^{i(x+\frac{2\pi}{3})} + e^{i(x+\frac{4\pi}{3})}\right) = \operatorname{Re}\left(e^{ix} \underbrace{(1 + j + j^2)}_{=0}\right) = 0.$$

**14.7 a)** On calcule :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^x \sin(x) dx &= \int_0^\pi e^x \operatorname{Im}(e^{ix}) dx = \int_0^\pi \operatorname{Im}(e^x e^{ix}) dx = \operatorname{Im}\left(\int_0^\pi e^{(1+i)x} dx\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\left[\frac{e^{(1+i)x}}{1+i}\right]_0^\pi\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{e^{\pi+i\pi} - 1}{1+i}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{-e^\pi - 1}{1+i}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{(-e^\pi - 1)(1-i)}{2}\right) \\ &= \frac{e^\pi + 1}{2}. \end{aligned}$$